

## LA LISTA

- 1.- *Acalymma blomorum* (= *pallipes*, *theimei*) M. + S., Col: Chrysomelidae; ayote; plaga potencial.
- 2.- *Acalymma* (= *Diabrotica*) *coruscum* (= *corrusca*, *corusca*) (Har.) Col.: Chrysomelidae; Cucurbitaceae, papa.
- 3.- *Acalymma* sp. (prob. *coruscum* (Har.)), Col: Chrysomelidae; Comayagua; adulto en julio; melón; plaga.
- 4.- *Acalymma fairmairei* (Baly), Col: Chrysomelidae; frijol, ayote; plaga.
- 5.- *Acalymma* sp., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, Tela, Cuyamel, Comayagua, Olancho, Tegucigalpa; adulto en mayo, junio, diciembre; ayote, melón, maíz, arroz (vegetativo), pepino; plaga.
- 6.- *Acalymma trivittatum* (= *vittata*) (Mann.), Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa; adulto en abril; vegetales, (ayote, chayote, melón, pepino, sandía); plaga; tortuguilla occidental rayada de pepino.
- 7.- *Acanthocephala femorata* (Fab.), Hemip: Coreidae; Tegucigalpa; adulto en enero; frutas, (papas).
- 8.- *Acanthoscelides obtectus* (Say), Col: Bruchidae; Tegucigalpa, Danlí, San Pedro Sula; adulto en febrero, mayo, octubre; semillas de frijol, (granos almacenados); plaga seria; gorgojo pintado.
- 9.- *Aconophora femoralis* Stal, Homop: Membracidae; Tegucigalpa, San Pedro Sula; adulto en febrero, noviembre; hojas de papayo; plaga rara.

- 10.- *Aconophora pugionata* (Germ.), Homop: Membracidae; Olancho; adulto en febrero; mango; periquito café.
- 11.- *Aconophora* sp., Homop: Membracidae; papayo, aguacate, cítricos.
- 12.- *Acrosternum marginatum* (P. de B.), Hemip: Pentatomidae; frijol, tomate; chinche verde de frijol.
- 13.- *Acrosternum* sp., Hemip: Pentatomidae; Catacamas; adulto en marzo; soya, (repollo); plaga; confundido con *Nezara*.
- 14.- *Aeneolamia postica* (Wlk.), Homop: Cercopidae; La Lima, San Pedro Sula; adulto en febrero, diciembre; pasto, arroz, muy común en caña de azúcar; plaga; mosca pintada.
15. *Aeneolamia* (= *Tomaspis*) sp., Homop: Cercopidae; El Zamorano, Guayamas, Tela, San Pedro Sula, La Ceiba; adulto en marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre; maíz, frijol, pasto, caña de azúcar; atacado por un hongo y arañas en la familia Salticidae; más común en la costa norte en campos húmedos; plaga seria, esporádica, localizada.
16. *Agallia lingula* Van Duzee, Homop: Cicadellidae; Comayagua, El Zamorano, Tegucigalpa; adulto en enero, marzo, mayo, octubre; alfalfa, frijol (vegetativo), pasto, higuerilla, malezas, (camote, tomate); común.
- 17.- *Agallia modesta* Osb. + Ball, Homop: Cicadellidae; pasto.
18. *Agrosoma placetis* Medl. o muy cerca, Homop: Cicadellidae; Comayagua, Catacamas, Tegucigalpa, Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Olancho; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, agosto, octubre, diciembre; hojas de remolacha, arroz (llenado de grano), malezas, soya, cebolla, maíz (madurez), frijol (vegetativo); común.
- 19.- *Agrosoma pulchella* (Guer.), Homop: Cicadellidae; papa.
- 20.- *Agrotis ipsilon* (= *ypsilon*) (Hufn.), Lep: Noctuidae; Comayagua, La Lima; adulto en mayo; larva en ornamentales, (papa, repollo, remolacha, zanahoria, lechuga, sorgo, tomate, maíz); gusano cortado negro; plaga potencial.

- 21.- *Agrotis malefida* Gn., Lep: Noctuidae; maíz, papa, ajo, cebolla, repollo, frijol, lechuga, sorgo, tomate; gusano cortador costado claro.
- 22.- *Agrotis* (= *Feltia*) *subterranea* (= *annexa*) (Fab.), Lep: Noctuidae; El Zamorano, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Comayagua, Siguatepeque; adulto en febrero, abril, marzo, mayo, junio, julio; larva en junio, julio, agosto, diciembre; maíz (plántula), algodón, frijol, tomate, chile, (cebolla, repollo, remolacha, zanahoria, ajo, lechuga, papa, arroz); se esconden en el suelo por el día, cortador; plaga esporádica, localizada, especialmente en maíz; gusano cortador granulado.
- 23.- *Alabama argillacea* (Hbn.), Lep: Noctuidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en mayo; larva en septiembre; criado de algodón, malezas en algodón, (maíz); plaga general, esporádica; el gusano medidor del algodón.
- 24.- *Aleurocanthus woglumi* Ashby, Homop: Aleyrodidae; aguacate, cítricos, mango; mosca prieta de los cítricos.
25. *Alkindus atratus* Dist., Hemip: Thyreocoridae, (=Corimelaenidae); Comayagua, San Jerónimo, La Esperanza; adulto en marzo, mayo, junio, agosto; suelo de arrozal, chupando el grano de arroz, arroz (vegetativo), pasto; plaga esporádica; muchas veces asociadas con *Galgupha* spp., los dos haciendo el mismo daño juntos.
26. *Altica amethystina* (Oliver), Col: Chrysomelidae; frijol.
27. *Altica* cerca de *amethystina* (Oliver), Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa, La Esperanza, adulto en marzo, agosto; rosas.
- 28.- *Altica* cerca de *jamaicensis* (= *plebeja*) Fab., Col: Chrysomelidae; La Esperanza, El Zamorano, Laguna de los Micos, Tegucigalpa; adulto en julio, agosto, octubre; arroz.
- 29.- *Altica* spp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, Tegucigalpa, Danlí, Choluteca, San Marcos; adulto en junio, agosto, septiembre; comiendo hojas de frijol, maíz; tortuguilla azul metálico; plaga seria, rara, localizada.
- 30.- *Amphicerus cornutus* (Pallas), Col: Bostrichidae; Comayagua; adulto en marzo, julio, septiembre; adulto es barrenador de los tallos de ornamentales; común.

31. *Anadasmus* (= *Stenoma*) sp., Lep: Stenomidae (= Oecophoridae: Stenomatinae); El Zamorano; adulto en enero; larva en octubre; tallo de aguacate; plaga seria, rara, localizada. La relación entre *Stenoma* y *Anadasmus* no es claro.
- 32.- *Anaedus punctatissimus* Blanchard, Col: Tenebrionidae; San Jerónimo; adulto en julio; raíces de arroz; parte del complejo del garrapacho; muchas veces confundido con *Cteis* y *Eutheola* que son más comunes.
- 33.- *Anasa scorbutica* (Fab.), Hemip: Coreidae; Olancho, El Zamorano, Choluteca, La Paz, Comayagua; adulto en mayo, julio, agosto (en cópula), septiembre; ayote (floración), maíz (llenado de grano); plaga rara.
- 34.- *Anasa* sp., Hemip: Coreidae; La Lima, Olancho, adulto en mayo junio, agosto; maíz.
- 35.- *Anasa tristis* (DeGeer), Hemip: Coreidae; ayote; plaga potencial; chinche de ayote.
- 36.- *Anastrepha distincta* Greene, Diptera: Tephritidae; mango; plaga.
- 37.- *Anastrepha ludens* (Loew.), Diptera: Tephritidae; aguacate, cítricos, mango, papaya, anona; plaga; mosca mexicana de la fruta.
- 38.- *Anastrepha obliqua* (= *mombinpraeoptans*) (Macq.), Diptera: Tephritidae; El Zamorano; adulto en marzo; jobo, mango, guayaba, cítricos, cerimoya, mamey, marañón, carambola, pomarosa; plaga; mosca de las frutas de las Indias Occidentales.
- 39.- *Anastrepha serpentina* (Weid.), Diptera: Tephritidae; Santa Rosa (Departamento Fco. Morazán); adulto en agosto; frutas, (caimito, zapote, naranja, anona, mango); plaga.
- 40.- *Anastrepha* sp., Diptera: Tephritidae; Tegucigalpa, La Lima, San Pedro Sula; adulto en enero, agosto, noviembre, diciembre; mango, (aguacate, cítricos, papaya); plaga.
- 41.- *Anastrepha* sp. (*fraterculus* (Wied.) o nueva), Diptera: Tephritidae cítricos, albaricoque, *Eugenia* (rose apple).

- 42.- *Anastrepha striata* Sch., Diptera: Tephritidae; Tegucigalpa; adulto en junio, julio; guayaba, (mango, zapote); plaga.
- 43.- *Anaxipha olmeca* (Sauss.), Orthop: Gryllidae; Tela; adulto en mayo, junio; maíz, arroz (vegetativo, llenado de grano); común.
- 44.- *Ancistrocercus circumdatus* (Wlk.), Orthop: Tettigoniidae; Comayagua, San Marcos, Tela; adulto en febrero, marzo, agosto; cocotero, cafeto; tal vez confundido con *Gongrocnemis* que es similar.
- 45.- *Ancyloxypha arene* (Edw.), Lep: HesperIIDae; San Jerónimo; adulto en agosto; arroz (vegetativo).
- 46.- *Anisocnemus* sp., Col: Carabidae; La Paz, Comayagua, San Jerónimo; adulto en mayo, junio, julio; suelo de arrozal; depredador.
- 47.- *Anomala* sp., Col: Scarabaeidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en enero, marzo, julio, septiembre, noviembre; girasol, (aguacate, pasto, mango).
- 48.- *Anomala* sp., Col: Scarabaeidae; Tegucigalpa; adulto en octubre; rosas.
- 49.- *Anomoea* sp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en mayo; frijol.
- 50.- *Antianthe expansa* (Germ.), Homop: Membracidae; Tegucigalpa Comayagua, Catacamas, Erandique; adulto en febrero, abril, junio, julio; chile, melón, tomate, cafeto, malezas; común; periquito verde de las solanáceas.
- 51.- *Anthonomus eugenii* Cano, Col: Curculionidae; Comayagua; adulto y larva en febrero, octubre; fruta de chile caída, (berenjena); plaga seria, general; picudo del chile.
- 52.- *Anthonomus grandis* Bohn., Col: Curculionidae; El Zamorano; adulto en octubre; algodón; plaga seria, general; picudo del algodón.
- 53.- *Anticarsia gemmatilis* (= *gemmatilis*) Hbn., Lep: Noctuidae; Comayagua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Gracias; adulto en

- marzo, mayo, junio, julio, agosto, diciembre; larva en julio, septiembre; criado de soya (vegetativo, llenado de grano) y frijol (vegetativo); plaga seria, general en soya, migratoria; gusano terciopelo.
- 54.- *Antonina graminis* (Mask.), Homop: Pseudococcidae; pasto.
  - 55.- *Aonidiella aurantii* (Mask.), Homop: Diaspididae; banano, naranjo, limón; escama roja de California.
  - 56.- *Apanteles* sp. (nueva especie), Hymenop: Braconidae; Porvenir; adulto en febrero; criado de *Sibine* sp. en cafeto; parásito.
  - 57.- *Aphis gossypii* Glov., Homop: Aphididae; La Lima; ninfas en julio; malezas (*Wedelia trilobata*), (ayote, cítricos, melón, plantas de la familia Malvaceae, berenjena, remolacha, repollo, zanahoria, chayote, pepino, lechuga, sandía); áfido del melón; áfido del algodón; plaga.
  - 58.- *Aphis spiraeicola* Patch, Homop: Aphididae; cítricos, aguacate, zanahoria; plaga.
  - 59.- *Aphis* sp., Homop: Aphididae; papaya, melón, chayote, pepino, berenjena, ayote.
  - 60.- *Apion godmani* Wagner, Col: Curculionidae; Danlí, Comayagua; adulto en enero, julio, agosto; larva en julio, diciembre; frijol (llenado de grano) atacando la vaina; plaga seria; picudo de la vaina de frijol.
  - 61.- *Apion samson* Sharp, Col: Curculionidae; La Paz; adulto en julio; soya.
  - 62.- *Apiomerus pictipes* H.—S., Hemip: Reduviidae; La Paz, El Rosario, Comayagua, Tegucigalpa, Choloma; adulto en enero, junio, julio, octubre; frijol (plántula), malezas en maizal; depredador.
  - 63.- *Apis mellifera* Linn., Hymenop: Apidae; El Zamorano, Tegucigalpa, Comayagua, La Esperanza; adulto en marzo, junio, julio, agosto, diciembre; malezas, maíz (floración), cítricos; común; abeja de miel; polinizador.
  - 64.- *Araecerus fasciculatus* (DeGeer), Col: Anthribidae; café, coco, maíz, granos almacenados; gorgojo del café.

- 65.- *Argia* sp. o cerca, Odonata: Coenagrionidae; Tela, La Lima, La Esperanza, El Zamorano, Comayagua, Tegucigalpa; adulto en enero, marzo, julio, agosto; arroz (vegetativo).
- 66.- *Arthrostictus sericatus* Bates, Col: Carabidae; Catacamas, Olancho, San Jerónimo, El Zamorano; adulto en junio, julio, octubre; suelo de maizal, suelo de arrozal; depredador.
- 67.- *Arthrostictus* sp., Col: Carabidae; Catacamas; adulto en junio; en el suelo; depredador.
- 68.- *Ascia* (= *Pieris*) *monuste* (Linn.), Lep: Pieridae; Tegucigalpa, El Zamorano, Danlí, La Ceiba, La Lima, San Pedro Sula, Comayagua; larva, pupa, y adulto en junio, agosto; larva en marzo, julio agosto, noviembre; adulto en mayo, agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre; remolacha, malezas, brócoli, repollo, (lechuga); mariposa blanca mayor del sur; plaga esporádica, general; más seria si la larva entra la cabeza de repollo; migratoria; siempre confundido con *Pieris rapae* o *Pieris brassicae*.
- 69.- *Aspisoma* sp., Col: Lampyridae; El Zamorano, Comayagua, Jamastrán; adulto en abril, mayo, junio, julio, septiembre; maíz, frijol.
70. *Ataenius* sp., Col: Scarabaeidae; San Jerónimo; adulto en junio; arroz.
71. *Atethmia subusta* Hbn., Lep: Noctuidae; maíz; tal vez *Bagisara repanda* (Fab.) es el nombre correcto de esta especie.
72. prob. *Atherigona* sp., Diptera: Muscidae; San Pedro Sula; larva en diciembre; criado de la fruta de tomate.
73. *Attalus viridivittatus* Champ., Col: Melyridae (Dasytidae, Malachiidae); depredador.
- 74.- *Attelabus* sp., Col: Curculionidae; Cortés; adulto en diciembre; guayabo.
- 75.- *Atta mexicana* (Smith), Hymenop: Formicidae; Tegucigalpa; adulto en enero; plantas en general; zompopo mexicano; plaga seria.

76. *Atta* sp., Hymenop: Formicidae; banano, papa, cítricos, maíz, cebolla; ataca muchas plantas; zompopo; plaga.
77. *Autoplusia egena* (Gn.), Lep: Noctuidae; El Zamorano, Comayagua; larva en marzo, noviembre; criado de una larva comiendo frijol; falso medidor confundido con *Trichoplusia ni* y *Pseudoplusia includens* pero es más raro; plaga potencial; falso medidor del frijol.
- 78.- *Azochis* sp. (complejo de "*gripusalis*" Wlk.), Lep: Pyralidae; Danlí; larva en octubre; criado de higos; plaga rara.
- 79.- *Azya luteipus* Muls., Col: Coccinellidae; depredador.
- 80.- *Barysomus* sp., Col: Carabidae; San Jerónimo; adulto en julio; suelo de arrozal; depredador.
- 81.- *Bemisia tabaci* (Genn.), Homop: Aleyrodidae; algodón, melón, cítricos, arroz, frijol, maíz, yuca, chayote, pepino, berenjena, papayo, ayote, tomate, sandía; plaga; mosca blanca del camote.
- 82.- *Blapstinus* sp., Col: Tenebrionidae; El Zamorano, San Jerónimo; adulto en enero, julio; larva en febrero; pepino, arroz (vegetativo); en el suelo antes de la siembra; larva es parte del complejo de los gusanos alambres; plaga esporádica, localizada.
- 83.- *Blapstinus substriatus* Champ., Col: Tenebrionidae; Comayagua; adulto en febrero; sorgo almacenado.
- 84.- *Blissus* "complejo de *leucopterus*" (Say), Hemip: Lygaeidae; San Jerónimo, Choloma; adultos y ninfas en mayo (adultos en cópula), septiembre; arroz (llenado de grano), pasto, (maíz, trigo); plaga potencial; chinche pequeña del arroz.
- 85.- *Blissus leucopterus hirtus* Mont., Hemip: Lygaeidae; prob. en maíz; chinche pequeña del arroz peludo.
86. *Bothrophorella nigra* (Stal), Hemip: Miridae; mango.
- 87.- *Brachyacantha bistripustulata* (Fab.), Col: Coccinellidae; La Ceiba, Tegucigalpa, El Zamorano, San Jerónimo, Comayagua; adulto en marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre, diciembre; cítricos, pepino, maíz, vegetales, frijol (vegetativo), guayabo; depredador.



- 88.- *Brachyacantha* sp., Col: Coccinellidae; El Zamorano, Comayagua; adulto en febrero, noviembre; maíz, higuera, guayabo; depredador.
- 89.- *Brachygastra mellifica* (Say), Hymenop: Vespidae; El Zamorano Comayagua, Barra Patuca; adulto en enero, marzo, noviembre; maíz (floración).
- 90.- *Brachymeria* sp., Hymenop: Chalcididae; Cortés; pupa en septiembre; de granos de café.
91. *Brevicoryne brassicae* (Linn.), Homop: Aphididae; repollo; plaga; áfido de repollo.
- 92.- *Burtinus notatipennis* Stal, Hemip: Alydidae; El Zamorano, Danlí; adulto en marzo, mayo; cítricos.
- 93.- *Cactophagus validirostris* Gyll., Col: Curculionidae; banano.
- 94.- *Caligo memnon* (Feld.) o muy cerca, Lep: Nymphalidae (=Brassolidae); La Lima; larva en marzo; banano; plaga seria, esporádica en Honduras.
- 95.- *Calleida* sp. (cerca de *decora* Fab.), Col: Carabidae; La Ceiba, Laguna de los Micos, Comayagua; adulto en marzo, julio, agosto, octubre; arroz (vegetativo), soya, maíz; depredador.
- 96.- *Calligrapha* spp., Col: Chrysomelidae; Santa Rosa de Copán, El Zamorano, La Ceiba, Comayagua; adulto en abril, mayo, agosto; tabaco, malezas, soya.
- 97.- *Callosobruchus maculatus* (Fab.), Col: Bruchidae; semillas de frijol secas; picudo del chícharo de vaca.
- 98.- *Calopteron reticulatum* (Fab.), Col: Lycidae; Danlí, El Zamorano, Guaimaca, La Lima, Olancho, La Esperanza; adulto en enero, abril, agosto; sorgo (madurez), maíz.
- 99.- *Calosoma* sp., Col: Carabidae; Comayagua, Choluteca; adulto en mayo, junio, comiendo una pupa de Lepidoptera; caña de azúcar; depredador.
100. *Campsomeris dorsata* (Fab.), Hymenop: Scoliididae; El Zamorano adulto en marzo; papayo.

101. *Camptodes chiriquensis* Sharp., Col: Nitidulidae; banano.
102. *Camptoprosopella* sp., Diptera: Lauxaniidae; Tegucigalpa; adulto en enero; alfalfa.
103. *Canthon* sp., Col: Scarabaeidae; Comayagua; adulto en mayo; higuera.
104. *Canthon viride* (Beauv.), Col: Scarabaeidae; hojas de papa; no dañino.
105. *Carpophilus* sp., Col: Nitidulidae; Olancho; adulto y larva en octubre; maíz.
106. *Cathartus quadricollis* (G.—M.), Col: Cucujidae; El Zamorano, Olancho, Tegucigalpa, Comayagua, Yoro; adulto en marzo, abril, septiembre, octubre, diciembre; elote de maíz, (granos almacenados); gorgojo cuello cuadrado de los granos.
107. *Catorhintha guttula* (Fab.), Hemip: Coreidae; Choluteca, La Paz, Comayagua; adulto en junio, julio, septiembre; frijol (madurez), soya, (maíz).
108. *Caulopsis cuspidata* (Scudder), Orthop: Tettigoniidae; Olancho, Comayagua, San Jerónimo, Tela, El Zamorano, Laguna de los Micos; adulto en enero, mayo, junio, julio, agosto; ninfas en septiembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), maíz (vegetativo); plaga seria cuando una población alta ataca la hoja bandera de arroz; común; chapulín verde de arroz.
109. *Cedusa* sp., Homop: Derbidae; Cuyamel; adulto en octubre; arroz.
110. "*Centrinaspis*" sp., Col: Curculionidae; Comayagua; adulto en mayo; maíz; vea *Geraeus* spp.
111. prob. *Centrinaspis* sp., Col: Curculionidae; Olancho; larva en octubre; tallo de maíz.
112. *Ceratitis capitata* (Wied.), Diptera: Tephritidae; Ocotepeque, Siguatepeque; (mango, cafeto, naranja, tomate, guayaba, papa-ya); mosca del mediterráneo; plaga rara en Honduras; confundido con *Anastrepha* que ocasiona más daño.

113. *Ceratomegilla* (= *Coleomegilla*) *maculata* (DeG.), Col: Coccinellidae; Danlí, El Zamorano, San Jerónimo, Comayagua, Olancho, Tela, La Paz; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto; maíz, soya, sorgo, pepino, arroz (vegetativo, llenado de grano); común en arroz; se alimenta de los huevos de *Spodoptera*, *Epilachna*.
114. *Ceresa concinna* Fowler, Homop: Membracidae; San Jerónimo; adulto en julio, agosto; arroz (vegetativo).
115. *Ceroplastes florindensis* (Coms.), Homop: Coccidae; cítricos, aguacate, mango, guayabo; escama cerosa floridana.
116. *Cerotoma* (= *Andrector*) *atofasciata* (Jacoby), Col: Chrysomelidae; La Esperanza, Pespire, El Rosario, Comayagua, La Paz, Olancho, Olanchito, El Zamorano, Danlí, Jamastrán; adulto en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre; soya (vegetativo), ayote, frijol (todas las etapas), maíz, arroz (vegetativo), sandía, pepino; tortuguilla de color variable; confundido con *Diabrotica*; se pueden transmitir virus; larvas comen raíces; siempre común, plaga general, seria en etapas críticas.
117. *Cerotoma* (= *Andrector*) *ruficornis* (Oliv.) (incluyendo subespecies *ruficornis ruficornis* (Oliv.) y *ruficornis rogersi* Jacoby), Col: Chrysomelidae; El Zamorano, Comayagua, La Paz, La Lima, San Pedro Sula, Danlí, Olancho; adulto en marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre; frijol (vegetativo, llenado de grano), soya (vegetativo), maíz (floración); tortuguilla de la hoja de frijol; confundido con *Diabrotica* y otras especies de *Cerotoma*; larva en las raíces, se puede transmitir virus; plaga general, rara.
118. *Cerotoma* sp., Col: Chrysomelidae; maíz, frijol.
119. *Chaetocnema* sp. (quizás *divergens* Baly), Col: Chrysomelidae; frijol, arroz, tomate, maíz.
120. *Chaetocnema* sp., Col: Chrysomelidae; La Ceiba, Tela, Cuyamel, La Lima, Comayagua, El Zamorano; adulto en febrero, marzo, mayo, agosto, septiembre, octubre, diciembre; maíz (floración, madurez), arroz, frijol; plaga rara, general.

121. *Chaetopsis* sp., Diptera: Otitidae; Nueva Ocotepeque; larva en septiembre; criado del tallo de maíz; plaga rara, a veces seria, localizada.
122. *Chalcophora* sp., Col: Buprestidae; Jamastrán, El Zamorano; adulto en julio, agosto; maíz.
123. *Chalepus* sp., Col: Chrysomelidae; Siguatepeque, El Zamorano, Olancho; adulto en junio, julio, diciembre; maíz.
124. *Chalepus verticalis* Chap., Col: Chrysomelidae; El Rosario; adulto en junio; maíz (floración).
125. *Chauliognathus distinguendus* Waterhouse, Col: Cantharidae; La Paz, El Rosario, Danlí, Jamastrán, El Zamorano; adulto en julio, agosto; rosas, malezas, maíz (vegetativo, madurez).
126. *Chauliognathus* sp., Col: Cantharidae; El Zamorano, Comayagua, La Esperanza; adulto en mayo, julio, agosto; maíz, aguacate, (frijol, pasto).
127. *Chelymorpha hopfneri* Bohn. o muy cerca, Col: Chrysomelidae; Danlí, Comayagua; adulto en agosto; maíz.
128. *Chelymorpha* sp., Col: Chrysomelidae; Taulabé, La Ceiba; adulto en marzo, septiembre; arroz.
129. *Chelysoma variabilis* (H. — S.), Hemip: Scutelleridae (=Pentatomidae en parte); Choluteca, Olancho, Tegucigalpa, Comayagua; adulto en enero, marzo, agosto, septiembre; maíz, maíz cerca de sandía.
130. *Chilocorus cacti* Linn., Col: Coccinellidae; El Zamorano, Comayagua; adulto en noviembre; cítricos; depredador.
131. *Chlorocoris atrispinus* Stal, Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, San José; adulto en marzo, julio; cítricos.
132. *Chlorogonia* (= *Tettigella*, *Metascarta*) *coeruleovittata* (Sig.), Homop: Cicadellidae; Tegucigalpa; adulto en marzo; vegetales, (maíz).
133. *Chlorotettix emarginatus* Baker, Homop: Cicadellidae; maíz.

134. *Chlorotetrix nigromaculatus* Delong + Wolc., Homop: Cicadellidae; San Jerónimo, Comayagua; adulto en octubre; frijol (vegetativo)
135. *Chlosyne lacina* (Geyer), Lep: Nymphalidae; Comayagua; larva en maíz pero se alimenta de malezas.
136. *Chrysapion* (= *Apion*) *chrysocumun* Gerst., Col: Curculionidae; San Marcos de Colón; adulto en enero; cafeto, a veces común.
137. *Chrysobothris* sp., Col: Buprestidae; Siguatepeque; naranjo, (mango).
138. *Chrysomphalus aonidum* (Linn.), Homop: Diaspididae; El Zamorano; adulto en julio, agosto; cítricos, (banano); escama roja de la Florida.
139. *Chrysomphalus dictyospermi* (Morg.), Homop: Diaspididae; cítricos, aguacate, mango.
140. *Chrysopa externa* Hagen, Neuroptera: Chrysopidae; La Paz, Comayagua, San Jerónimo, El Zamorano; adulto en marzo, mayo, junio; frijol, arroz (vegetativo), maíz (floración, madurez); depredador.
141. *Cicindela* sp., Col: Carabidae (=Cicindelidae); El Zamorano; adulto en septiembre; maíz; depredador.
142. *Clastoptera* sp., Homop: Cercopidae; El Zamorano, Comayagua, Olancho; adulto en marzo, mayo, septiembre; arroz, maíz (madurez), higuerrillo.
143. *Cleistolophus similis* Chevr. o cerca, Col: Curculionidae; Utila; adulto en enero; chile.
144. *Cleistolophus* sp., Col: Curculionidae; Juticalpa, Catacamas; adulto en junio; maíz (vegetativo); común.
145. *Cleistolophus* sp. (cerca de *subfaciatus* Sharp), Col: Curculionidae Catacamas; adulto en junio; maíz.
146. *Coccus hesperidum* Linn., Homop: Coccidae; cítricos, aguacate piña, banano; escama parda blanda.
147. *Coccus mangiferae* (Green), Homop: Coccidae; cítricos, mango, aguacate.

148. *Coccus viridis* (Green), Homop: Coccidae; cafeto, cítricos, guayabo; escama verde.
149. *Colaspis hypochlora* Lefevre o cerca, Col: Chrysomelidae; Danlí, El Rosario, San Jerónimo, Comayagua, San Pedro Sula, La Lima, La Ceiba, Tela, Juticalpa; adulto en febrero, mayo, junio, julio, septiembre, octubre; maíz (madurez), arroz (vegetativo, llenado de grano), frijol (plántula); plaga.
150. *Colaspis prasina* Lefevre, Col: Chrysomelidae; papa, frijol, berenjena.
151. *Colaspis* spp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, Olancho, La Esperanza, La Ceiba, Tela; adulto en mayo, junio, julio, agosto; maíz (vegetativo), papa, arroz.
152. *Collaria oleosa* (Dist.), Hemip: Miridae; El Zamorano, Comayagua, San Jerónimo, La Lima, La Ceiba; adulto en enero, marzo, julio, agosto, octubre; frijol (plántula, vegetativo), arroz (vegetativo), pepino (vegetativo).
153. *Collops paradoxa* Champ., Col: Melyridae (=Malachiidae); depredador.
154. *Colopterus* sp. (cerca de *macropterus* (Fab.)), Col: Nitidulidae; Olancho, Yoro, El Zamorano; adulto en marzo, abril, diciembre; maíz (llenado de grano), en el grano del elote inmaduro, maíz cerca de sandía bajo riego; común.
155. *Colopterus* sp. (cerca de *posticus* (Er.)), Col: Nitidulidae; Olancho, Comayagua, Cortés; adulto en enero, marzo, agosto; maíz, flor de cítricos, cafeto.
156. *Colopterus* spp., Col: Nitidulidae; Olancho, El Rosario; adulto en abril, julio, octubre; maíz (madurez) en el elote.
157. *Condylostylus* sp., Diptera: Dolichopodidae, Tegucigalpa, El Zamorano, La Paz; adulto en marzo, mayo, junio; algodón, maíz (floración).
158. *Conocephalus* sp., Orthop: Tettigoniidae; Santa Rosa de Copán, La Esperanza, La Ceiba, Laguna de los Micos, Tela, Cuyamel, Comayagua, San Jerónimo; ninfas en mayo, agosto, septiembre.

- octubre; adulto en marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), tabaco, ajonjolí, soya (vegetativo), maíz (madurez), asociado con *Caulopsis cuspidata*, común a veces, plaga general, seria cuando poblaciones altas ataca la hoja bandera.
159. *Conroderus rodriguezi* (Cand.), Col: Elateridae; Comayagua, Tegucigalpa; adulto en mayo, junio; maíz.
160. *Conotelus* sp. (*mexicanus* Murr. o cerca), Col: Nitidulidae; Tegucigalpa, Catacamas; adulto en enero, mayo, julio; flor de ajonjolí, maíz, rosas.
161. *Conotrachelus aguacatae* Barb., Col: Curculionidae; aguacate; picudo del aguacate.
162. *Copturus* sp., Col: Curculionidae; aguacate.
163. *Corcyra cephalonica* (Stain.), Lep: Pyralidae (=Galleriidae); Choluteca; adulto, larva, y pupa en junio; grano almacenado de sorgo; plaga seria, localizada; mariposa de los granos de arroz.
164. *Corythucha gossypii* (Fab.) o cerca, Hemip: Tingidae; Comayagua; adulto en septiembre; camote (haciendo daño en las hojas cambiándoles el color a café amarillento); (banano, frijol, tomate, berenjena); plaga rara, localizada; chinche de encaje del algodón.
165. *Cosmopolites sordidus* (Germ.), Col: Curculionidae; El Zamorano, La Lima; adulto en mayo; banano; plaga; barrenador de las raíces del banano.
166. *Cossonus corticalis* Fab., Col: Curculionidae; aguacate, papayo; se alimenta de las hojas pero no hace daño económico.
167. *Cotinis mutabilis* G. + P., Col: Scarabaeidae; San Pedro Sula, El Zamorano, Comayagua; adulto en marzo, agosto, septiembre, octubre; sorgo, cítricos (maíz, piña).
168. *Creontiades purgatus* (Stal), Hemip: Miridae; Tegucigalpa, Comayagua; adulto en enero, diciembre; alfalfa, pepino.
169. *Creontiades rubinervis* (Stal), Hemip: Miridae; papa.

170. *Creontiades* sp. (prob. *rubrinervis* (Stal)), Hemip: Miridae; Comayagua, La Paz, El Zamorano; adulto en enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre; frijol (vegetativo, llenado de grano, madurez), maíz (madurez), higuera, soya, maní, pepino; común.
171. *Cteisa* nueva especie, Col: Alleculidae; San Jerónimo; adulto en julio; arroz (vegetativo), suelo de arrozal.
172. *Ctenochira hectica* Boh., Col: Chrysomelidae; San José, Comayagua; adulto en julio, agosto; frutales, malezas.
173. *Cyclocephala melanocephala* (Fab.), Col: Scarabaeidae; Comayagua; adulto en noviembre; girasol.
- 174 *Cyclocephala ovulum* Bates o cerca, Col: Scarabaeidae; Tegucigalpa; adulto en mayo; rosas.
175. *Cycloneda sanguinea* (Linn.), Col: Coccinellidae; El Zamorano, Jamastrán, La Ceiba, Olancho, Olancho, La Lima, San Pedro Sula, Choloma, Comayagua; adulto en marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre; larva y pupa en enero, diciembre; sorgo (madurez), malezas, frijol (llenado de grano), chile dulce, tomate, soya, pepino (vegetativo), maíz (floración, llenado de grano, madurez), arroz; la larva se alimenta de *Rhopalosiphum maidis* y otros áfidos; común, especialmente en maíz; depredador.
176. *Cryoptus suavis* Stal, Homop: Fulgoridae; La Ceiba, El Zamorano; adulto en mayo, agosto; frijol, maíz (madurez).
177. *Cyrtodisca major* (Sig.), Homop: Cicadellidae; Tegucigalpa; adulto en noviembre; ornamentales (eucalipto).
178. *Cyrtomenus bergi* Froesh., Hemip: Cydnidae; San Jerónimo, Comayagua, La Lima, El Paraíso; ninfa en julio; adulto en enero, marzo, abril, junio, julio; raíces de maíz y arroz (plántula), en el suelo antes de la siembra; plaga esporádica, localizada.
179. *Cyrtomenus ciliatus* (Pal. de B.), Hemip: Cynidae; Santa Bárbara; adulto en noviembre; raíces de maíz, (arroz); plaga esporádica localizada.



180. *Cyrtomenus* sp., Hemip: Cydnidae; Comayagua, La Paz, Danlí, San Pedro Sula, La Lima; ninfa en febrero; adulto en marzo, junio, diciembre; raíces de repollo, raíces de frijol; plaga; la taxonomía de este grupo es difícil.
181. *Dalbulus* (= *Baldulus*) *maidis* (Del. + Wolc.), Homop: Cicadellidae; Catacamas, El Zamorano; adulto en julio; maíz (vegetativo); vector de achaparramiento de maíz; chicharrita de maíz; plaga rara, localizada.
182. *Deloyala guttata* (Oliv.), Col: Chrysomelidae; El Zamorano, Comayagua, Olancho, La Ceiba, San Jerónimo; adulto en mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre; maíz (vegetativo), arroz (vegetativo), vivero de cítricos; común; tortuguilla manchada.
183. *Dendrobias mandibularis* Ser., Col: Cerambycidae; papayo, cítricos.
184. *Dendroctonus frontalis* Zimmer., Col: Scolytidae; Tegucigalpa; adulto en octubre; en la madera de pino; plaga; escarabajo del pino suraño.
185. *Dendroctonus valens* LeC., Col: Scolytidae; El Hatillo; adulto en julio; pino; escarabajo rojo del pino.
186. *Derosomus* sp. (nueva?), Col: Curculionidae; San Marcos de Colón; adulto en diciembre; frijol.
187. *Diabrotica adelpha* Har., Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa, Comayagua; adulto en marzo, mayo; vegetales, higuera, (frijol, papa, arroz, camote, tomate); plaga rara en Honduras, localizada; más común en Costa Rica.
188. *Diabrotica balteata* LeConte, Col: Chrysomelidae; Tela, El Zamorano, Jamastrán, La Ceiba, San Pedro Sula, Choloma, Tegucigalpa, Comayagua, La Paz, Catacamas; adulto en enero, febrero, marzo (en cópula), abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre; pepino, frijol (todas las etapas), chile dulce, tomate, repollo, remolacha, pasto, papa, ayote, alfalfa, cítricos, maíz (floración), ajonjolí, maní, malezas, soya, higuera, (melón, calabaza, chayote, berenjena, camote, sandía, banano, arroz); plaga general seria en poblaciones altas; la

especie de *Diabrotica* más común; tortuguilla de las franjas verdes de pepino.

189. *Diabrotica biannularis* (= *ocellata*) Har., Col: Chrysomelidae; Comayagua, Siguatepeque, El Zamorano, La Esperanza, Danlí; adulto en mayo, julio, agosto; frijol, maíz, (ayote); tortuguilla de los dos anillos.
190. *Diabrotica nummularis* Har. o cerca, Col: Chrysomelidae; El Zamorano, La Ceiba; adulto en febrero, abril, mayo; cítricos, maíz (floración), (papa).
191. *Diabrotica octoplagiata* Jacoby, Col: Chrysomelidae; Danlí; adulto en agosto, frijol.
192. *Diabrotica porraca* Har., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, La Paz, Olancho; adulto en marzo, mayo, julio, agosto; pepino, repollo (madurez), maíz (vegetativo, floración), (papa, camote); común en Olancho; tortuguilla de las cuatro rayas amarillas.
193. *Diabrotica pulchella* (Jac+duVal.), Col: Chrysomelidae; Danlí, Olancho; adulto en mayo, agosto; frijol, maíz (vegetativo), (pasto).
194. *Diabrotica* sp. (cerca de *variegata* Jacoby), Col: Chrysomelidae; El Zamorano; adulto en mayo; repollo.
195. *Diabrotica* spp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, El Zamorano, Olancho, Yoro; maíz (floración), repollo (madurez), soya (floración), cafeto, frijol, (melón, chayote, pepino, berenjena, papa, arroz, camote, ayote, sorgo, tomate, sandía).
196. *Diabrotica tibialis* Jacoby, Col: Chrysomelidae; La Ceiba; adulto en octubre; frijol, arroz, papa, (banano).
197. *Diabrotica* (= *Gynandrobrotica*) *variabilis* Jacoby, Col: Chrysomelidae; frijol.
198. *Diabrotica variegata* Jacoby o muy cerca, Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa, Olancho, Comayagua, La Paz, San Jerónimo, Danlí, El Zamorano, Taulabé; adulto en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre; maíz (vegetativo,

- floración), sorgo, arroz (vegetativo), repollo; tortuguilla amarilla común; plaga esporádica.
199. *Diabrotica viridula* Fab., Col: Chrysomelidae; Comayagua, El Rosario, Jamastrán, El Zamorano, Olancho, Catacamas, La Lima, Choloma; adulto en enero, mayo, junio, julio, agosto, octubre; repollo, frijol (plántula), maíz (vegetativo, floración, madurez), ajonjolí, (banano); tortuguilla de maíz; plaga en poblaciones altas, general.
200. *Diadegma insulare* (Cr.), Hymenop: Ichneuemonidae; El Zamorano; adulto en mayo; criado de la pupa de *Plutella xylostella*; común; parásito.
201. *Diaphania* (= *Margaronia*) *hyalinata* (Linn.), Lep: Pyralidae; La Ceiba, Comayagua; adulto en mayo, junio, julio, agosto, septiembre; larva en octubre; en las frutas, flores, y tallos de pepino y ayote, (sandía); plaga general, muy seria, puede matar la planta; gusano de melón.
202. *Diaphania* (= *Margaronia*) *nitidalis* (Stoll), Lep: Pyralidae; Comayagua, La Ceiba, El Zamorano, Lago de Yojoa; adulto en febrero, mayo, julio, agosto, septiembre; larva en octubre, noviembre; en las frutas, flores y tallos de pepino y ayote, (melón, chayote, berenjena, sandía); plaga muy seria, general; puede matar la planta; gusano de pepino.
203. *Diatraea* (= *Zeadiatraea*) *lineolata* (Wlk.), Lep: Pyralidae (= Crambidae); Choluteca, Comayagua, El Rosario, Jamastrán, Olancho; adulto en agosto; larva en marzo, julio, octubre (en diáspausa), noviembre; pupa en julio; tallo de maíz, caña de azúcar; barrenador neotropical de maíz; plaga esporádica, general.
204. *Diatraea saccharalis* (Fab.), Lep: Pyralidae (= Crambidae); Comayagua, Olancho, La Ceiba, San Pedro Sula; adulto en enero, febrero, abril, agosto, octubre; larva en marzo (en diáspausa), mayo, junio, agosto; en el tallo (vegetativo) y la mazorca de maíz, caña de azúcar, arroz, (sorgo); barrenador de la caña de azúcar; plaga esporádica, general.
205. *Diceroprocta alacris* (Stal), Homop: Cicadidae; San Pedro Sula, Comayagua, La Ceiba; adulto en marzo, abril, mayo; cítricos, mango.

206. *Diphaulaca* sp. (cerca de *wagneri* Har.), Col: Chrysomelidae; Jamastrán, La Esperanza; adulto en junio, julio; frijol (plántula); plaga seria si ataca la plántula.
207. *Discoderus* sp., Col: Carabidae; San Jerónimo; adulto en mayo; suelo de arrozal; depredador.
208. *Discodon* sp., Col: Cantharidae; El Zamorano; adulto en marzo; aguacate.
209. *Disonycha* (= *Disonychus*) *dorsata* Har., Col: Chrysomelidae; Comayagua; adulto en mayo, julio; maíz, malezas.
210. *Disonycha glabrata* Fab., Col: Chrysomelidae; Danlí, La Esperanza, El Zamorano, La Paz, Comayagua, Olancho, Catacamas, Tegucigalpa, La Lima, Cuyamel; adulto en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto; maíz (floración), sandía, papa-ayote asociado, frijol (madurez), arroz, higuierilla, (tomate); común en campos con malezas; plaga rara, general; tortuguilla rayada de los vegetales.
211. *Disonycha* (= *Disonychus*) spp., Col: Chrysomelidae; Danlí, El Zamorano, Tegucigalpa, La Paz; adulto en mayo, julio, septiembre; maíz (floración), arroz.
212. *Doleranus* (= *Chlorotettix*) *tethys* (Van Duzee), Homop: Cicadellidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en marzo, octubre; arroz, frijol (plántula), malezas.
213. *Draeculacephala clypeata* Osb., Homop: Cicadellidae; La Lima, Tela, La Ceiba, El Zamorano, Comayagua, Juticalpa, Danlí; adulto en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), soya (floración), (pasto); lorito verde de arroz; plaga general en arroz, esporádica.
214. *Draeculacephala minerva* Ball, Homop: Cicadellidae; frijol, pasto; transmite la enfermedad de Pierce en vid; lorito verde del pasto.
215. *Draeculacephala portola* Ball, Homop: Cicadellidae; maíz, papa.

216. *Draeculacephala producta* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; San Jerónimo, El Zamorano; adulto en marzo, julio; arroz, cítricos.
217. *Draeculacephala soluta* Gibson, Homop: Cicadellidae; La Ceiba, Tela, San Jerónimo, Danlí; adulto en mayo, junio, julio septiembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), maíz, soya (floración).
218. *Drosophila melanogaster* Mg., Diptera: Drosophilidae; frutas dañadas.
219. *Drosophila* sp. (grupo de *repleta* Woll.), Diptera: Drosophilidae; Güinope; adulto en junio; aguacate.
220. *Dysdercus flavolimbatus* Stal, Hemip: Pyrrhocoridae; Talanga; adulto en noviembre; algodón.
221. *Dysdercus mimulus* Hussey, Hemip: Pyrrhocoridae; Talanga; adulto en noviembre; algodón, (papa).
222. *Dysdercus mimus* (Say), Hemip: Pyrrhocoridae; Olanchito; adulto en noviembre; calabaza.
223. *Dysdercus obliquus* (H. - S.), Hemip: Pyrrhocoridae; Talanga, Comayagua, El Zamorano; adulto en marzo, abril, junio; algodón.
224. *Dysdercus* spp., Hemip: Pyrrhocoridae; La Paz, Comayagua, La Lima, San Pedro Sula, Cortés, La Ceiba, El Zamorano, Juticalpa Olanchito, Santa Rosa de Copán, Roatán; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, julio, agosto, diciembre; ninfas en junio; frijol (madurez), malezas, algodón, chile, maíz (floración, madurez).
225. *Dyseuaresta mexicana* (Wied.), Diptera: Tephritidae; Tegucigalpa adulto en enero; alfalfa.
226. *Dysmicoccus brevipes* (Ckll.), Homop: Pseudococcidae; cafeto, piña, cítricos; chinche harinosa de la piña.
227. *Edessa rufomarginata* (DeG.), Hemip: Pentatomidae; Tegucigalpa, Erandique, Olanchito; adulto en marzo, abril, julio; tomate, berenjena, *Solanum verbascifolium*; plaga rara, localizada.

228. *Eiphosoma* sp., Hymenop: Ichneuemonidae; La Ceiba, San Jerónimo; adulto en marzo, junio, julio; parásito de una larva de Lepidóptera; arroz.
229. *Elasmopalpus lignosellus* (Zeller), Lep: Pyralidae; Danlí, El Zamorano, Comayagua; larva en enero, mayo, junio, agosto; frijol, criado de maíz, (sorgo, pasto, arroz, tomate); plaga seria, esporádica, localizada; coralillo; barrenador menor del tallo de maíz.
230. *Empoasca arator* David + Del., Homop: Cicadellidae; Comayagua; adulto en octubre; frijol (vegetativo); plaga.
231. *Empoasca canda* R. + M., Homop: Cicadellidae; frijol; plaga.
232. *Empoasca kraemeri* (= *fabae* en Centroamérica) R. + M., Homop: Cicadellidae; Comayagua; adulto en octubre; frijol (vegetativo), (maíz, papa); plaga seria; asociado con enfermedades; tal vez un vector; salta hoja común de frijol.
233. *Empoasca papayae* Oman, Homop: Cicadellidae; papayo; transmite "bunchy top virus" de papayo; plaga; salta hoja verde del papayo.
234. *Empoasca phaseola* Oman, Homop: Cicadellidae; Comayagua; adulto en octubre; frijol (vegetativo); plaga.
235. *Empoasca* spp., Homop: Cicadellidae; El Zamorano, Comayagua, Danlí; adulto en marzo, agosto, octubre; frijol (todas las etapas) maní (floración), (papa, remolacha, zanahoria); plaga.
236. *Enoclerus salvini* (Gorh.), Col: Cleridae; El Rosario, La Esperanza; adulto en junio, octubre; frijol (plántula); cogollo de maíz.
237. *Ephestia* (= *Cadra*) *cautella* (Wlk.), Lep: Pyralidae; Catacamas, Tegucigalpa; adulto en agosto; larva en marzo; criado del grano de maíz almacenado; plaga; mariposa del almendro.
238. *Epicaerus inaequalis* (Sharp), Col: Curculionidae; papa.
239. *Epicauta pestifera* Werner, Col: Meloidae; camote; botijón marginata.

240. *Epicauta* spp., Col: Meloidae; San Pedro Sula, La Esperanza, Comayagua, Catacamas, Tegucigalpa, Choluteca; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, junio; papa, tomate, alfalfa; plaga.
241. *Epicauta vitticollis* Haag., Col: Meloidae; papa, tomate.
242. *Epilachna mexicana* (= *defecta*) (Guer.), Col: Coccinellidae; Valle de Siria; adulto en septiembre; frijol.
243. *Epilachna tredecimnotata* (Latr.), Col: Coccinellidae; Danlí, El Zamorano, Comayagua, Tegucigalpa, Olancho, Catacamas, Choloma; adulto en enero, abril, mayo, julio, agosto; ayote, maíz, repollo, malezas, (cítricos, melón, chayote, sandía, pepino); antes confundido con *Epilachna borealis* que no ocurre en Honduras; común; conchuela del ayote hondureño.
244. *Epilachna varivestis* Muls. Col: Coccinellidae; Olancho, El Zamorano, Danlí, Comayagua; adulto en enero, mayo, julio; larva en noviembre; frijol; confundido con otra *Epilachna*; plaga esporádica en Honduras; conchuela del frijol mejicano.
245. *Epitragus sallaei* Champ., Col: Tenebrionidae; Comayagua; adulto en marzo, julio; maíz.
246. *Epitragus* sp., Col: Tenebrionidae; Comayagua; adulto en marzo julio, noviembre, diciembre; maíz (madurez), frijol (madurez), arroz.
247. *Epitrix* sp., Col: Chrysomelidae; Santa Rosa de Copán, La Ceiba Agua Sucia; adulto en julio, noviembre; chile, tabaco, tomate, (maíz, berenjena, papa, arroz, remolacha); plaga rara, general.
248. *Erinnyis ello* (Linn.), Lep: Sphingidae; Comayagua; larva en julio; criado de papayo; se notó un ave comiendo el gusano; plaga esporádica, general; gusano cachón.
249. *Erythrodiplax connata* (Burm.), Odonata: Libellulidae; San Jerónimo; adulto en septiembre; arroz (llenado de grano); depredador.
250. *Erythrodiplax funerea* (Hag.), Odonata: Libellulidae; San Jerónimo, La Lima, El Zamorano; adulto en abril; arroz (llenado de grano); depredador.

251. *Erythrodiplax umbrata* (Linn.), Odonata: Libellulidae; San Jerónimo, Catacamas; adulto en marzo, septiembre; arroz (llenado de grano), soya; depredador.
252. *Erythrogonia areolata* (Sign.), Homop: Cicadellidae; Comayagua San Jerónimo, Danlí, Olancho, La Lima, San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Zamorano; adulto en abril, mayo, junio, julio, agosto; mango, malezas, maíz (vegetativo), arroz (vegetativo), vegetales, yuca, (papa); común; salta hoja roja de arroz.
253. *Erythrogonia jucunda* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; La Ceiba, Tegucigalpa, Danlí; adulto en marzo, mayo, junio, agosto, noviembre, diciembre; cítricos, (maíz).
254. *Erythrogonia laudata* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Laguna de los Micos, Tela, El Zamorano, La Ceiba, Olancho; adulto en mayo, agosto, octubre; chile, arroz (llenado de grano), maíz (madurez).
255. *Estigmene acraea* (= *acraea*) (Drury), Lep: Arctiidae; Choluteca, Jamastrán, El Zamorano, La Paz, Comayagua, La Lima; adulto en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre; larva en enero, febrero, marzo, junio, agosto, octubre, noviembre, diciembre; frijol (vegetativo, llenado de grano), maíz, girasol, soya, algodón, sorgo, cebolla, repollo, pepino, (ayote, chayote, melón, sandía); gusano peludo; plaga general, seria en etapas críticas; común.
256. *Etiella zinckenella* (Treit.), Lep: Pyralidae; Comayagua, El Zamorano; larva en enero; larva y adulto en marzo; criado de las vainas de frijol, comiendo las semillas; plaga esporádica; gusano barrenador del ejote; plaga rara, localizada.
257. *Eucoleocerus* sp., Col: Curculionidae; Olancho; adulto en junio; maíz (floración).
258. *Eumecosomyia nubila* (Wied.), Diptera: Otitidae; El Zamorano Comayagua, Nueva Ocotepeque, Olancho; adulto en marzo, abril, octubre, noviembre; larva en junio, noviembre; maíz (floración), sorgo (vegetativo), (arroz); común; tal vez confundido con *Chaetopsis flavifrons* (Macq.) que es muy similar.
259. *Eumolpus* sp., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, Comayagua; adulto en febrero, mayo, junio, agosto; maíz, frutales, malezas.



260. *Euphoria* sp. (*limatula* Jans. o *leucographa* ((G. + P.)), Col: Scarabaeidae; El Zamorano, Tegucigalpa, Intibucá, La Paz, El Rosario, La Ceiba, Comayagua; adultos en abril, mayo, junio, julio, diciembre; maíz (vegetativo, llenado de grano, madurez), cítricos.
261. *Euptoieta* sp., Lep: Nymphalidae; La Paz, Olancho, Danlí; larva en mayo, noviembre; maíz, algodón, frijol; se alimenta de las malezas.
262. *Eurema albula* (Cramer), Lep: Pieridae; malezas (*Cassia*).
263. *Euschistus bifibulus* (P. de B.), Hemip: Pentatomidae; Catacamas; adulto en abril; soya, (papa).
264. *Euschistus crenator* (Fab.), Hemip: Pentatomidae; San Jerónimo; adulto en agosto; arroz (vegetativo).
265. *Euschistus* sp. (cerca de *bifibulus* (P. de B.)), Hemip: Pentatomidae; Catacamas, La Ceiba, San Pedro Sula, La Paz; adulto en enero, marzo, julio; soya, maíz (madurez).
266. *Euschistus* sp., Hemip: Pentatomidae; La Esperanza, Choluteca, Danlí, El Zamorano, Comayagua, San Pedro Sula, Olancho, Tegucigalpa; adulto en febrero, marzo, mayo, julio, agosto, diciembre; frijol (llenado de grano), maíz (floración, madurez), maíz cerca de campo de sandía, arroz (vegetativo), hoja de tomate, (papa, cítricos).
267. *Euschistus quadrator* Rol., Hemip: Pentatomidae; Siguatepeque; adulto en diciembre; frijol.
268. *Eustylus* sp., Col: Curculionidae; *Utila*; adulto en enero; chile.
269. *Euetheola humilis* (= *bidentata*) Burm., Col: Scarabaeidae; Danlí, La Ceiba, Comayagua, San Jerónimo, Catacamas, San Pedro Sula, Olancho; adulto en marzo, mayo, junio, julio; raíces de maíz, raíces de arroz (plántula, vegetativo); garapacho verdadero (confundido con otras especies de Carabidae, Tenebrionidae y Scarabaeidae); plaga seria; localizada, adultos comiendo raíces y tallos en el suelo.

270. *Euthyrhynchus floridanus* (Linn.), Hemip: Pentatomidae; depredador de *Euphoria* sp.
271. *Euxesta* sp., Diptera: Otitidae; Tegucigalpa, El Zamorano, Olancho; adulto en mayo; maíz (vegetativo); plaga potencial.
272. *Evergestis rimosalis* (Gn.), Lep: Pyralidae; El Zamorano; larva en septiembre, noviembre; repollo; gusano de repollo de las franjas cruzadas; plaga esporádica, localizada.
273. *Faula mexicana* Har., Col: Scarabaeidae; Güinope; adulto en mayo; cítricos.
274. *Faustinus ovatipennis* (Champ.), Col: Curculionidae; San Pedro Sula; adulto en enero; tomate, larva en los tallos; plaga rara, localizada.
275. *Flatormenis* (= "*Ormenis*") sp., Homop: Flatidae; El Zamorano adulto en junio, julio; mango.
276. *Frankliniella* sp., Thysanoptera: Thripidae; banano, maíz
277. *Frankliniella williamsi* Hood, Thysanoptera: Thripidae; maíz, cebolla.
278. *Fundella pellucens* Zeller, Lep; Pyralidae; Comayagua; larva en junio; frijol; plaga rara; barrenador del Caribe de la vaina de frijol.
279. *Galgupha guttiger* (Stal), Hemip: Thyreocoridae (= Corime-laenidae); Comayagua, Danlí, La Paz, Olancho; adulto en marzo, junio, octubre, diciembre; arroz, maíz, en el suelo.
280. *Galgupha quadrisignata* (Stal), Hemip: Thyreocoridae; La Lima; adulto en enero; maíz.
281. *Galgupha* sp., Hemip: Thyreocoridae; Comayagua; adulto en julio; arroz.
282. *Garganus gracilentus* (Stal), Hemip: Miridae; Tegucigalpa, Olancho, Comayagua, El Zamorano; adulto en enero, junio, septiembre, octubre; alfalfa, soya (floración), frijol (llenado de grano), repollo.
283. *Geocoris punctipes* (Say), Hemip: Lygaeidae; Comayagua, El Zamorano, Olancho; adulto en enero, febrero, marzo, abril; alfalfa, maíz (madurez), chile, frijol (madurez); depredador.

284. *Geocoris* sp., Hemip: Lygaeidae; Comayagua, La Paz, El Zamorano; adulto en marzo, abril, julio; frijol (madurez), soya, maní; depredador.
285. *Geraeus* spp. (*G. senilis* (Gyll.), *G. prob. tonsilis* (Boh.), *G. prob. submaculatus* Champ.), Col: Curculionidae; Jamastrán, Comayagua, Olancho, El Zamorano, San Marcos de Colón; adulto en junio, julio, agosto, septiembre; maíz (floración); la taxonomía de este grupo y su relación con el género *Centrinaspis* no es claro.
286. *Geraeus lineellus* (Le Conte), Col: Curculionidae; La Ceiba; adulto en marzo, abril, septiembre; toronjo, sorgo.
287. *Glyptoscelis* sp. (prob. *chontalensis* Jacoby), Col: Chrysomelidae; Choluteca; adulto en junio; caña de azúcar.
288. *Graminella cognita* Cald., Homop: Cicadellidae; frijol.
289. *Graphocephala rufimargo* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Danlí; adulto en noviembre; rosas.
290. *Gryllootalpa* (= *Neocurtilla*) *hexadactyla* Perty, Orthop: Gryllootalpidae; Comayagua, La Lima; adulto en abril, septiembre, octubre; en el suelo antes de la siembra de maíz; plaga potencial es probable que *Neocurtilla* sea el género correcto.
291. *Gryllus* (= *Acheta*) sp. (complejo de *assimilis* (Fab.)), Orthop: Gryllidae; Comayagua, El Zamorano, La Lima; adulto en febrero, abril, mayo, junio; maíz, frijol, (cebolla, tomate, arroz).
292. *Gynandrobrotica lepida* (Say), Col: Chrysomelidae; frijol, pastos.
293. *Gynandrobrotica nigrofasciata* Jacoby, Col: Chrysomelidae; Olancho; adulto en abril; frijol.
294. *Gynandropus* sp., Col: Carabidae; Olancho; adulto en junio; en el suelo; depredador.
295. *Halticoptera* sp., Hymenop: Pteromalidae; Comayagua; larva en octubre; parásito de la minador de frijol, *Liriomyza* sp.
296. *Halticus bractatus* (Say), Hemip: Miridae; Agua Sucia, Danlí; adulto en enero, octubre; vegetales, tomate, (papa, algodón,

- cítricos, frijol, melón, chayote, pepino, berenjena, ayote, chile, sandía); falsa pulgón del jardín.
297. *Halticus* sp. (*bractatus* (Say) o cerca), Hemip: Miridae; Comayagua; adulto en abril; maíz (vegetativo).
298. *Heliothis subflexus* (Gn.), Lep: Noctuidae; Comayagua; adulto en septiembre; plaga potencial, pero se prefiere malezas.
299. *Heliothis virescens* (Fab.), Lep: Noctuidae; Comayagua, Santa Rosa de Copán; La Esperanza; adulto en mayo, diciembre; larva en junio, octubre; malezas (*Martynia annua*), criado de algodón, tomate; plaga; bellotero de tabaco.
300. *Heliothis zea* (Boddie), Lep: Noctuidae; El Zamorano, La Paz, Comayagua, Lago Yojoa, Santa Rosa de Copán, Danlí; adulto en marzo, abril, mayo, diciembre; pupa en junio; larva en febrero, abril, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre; en fruta de tomate, elote de maíz, pelo de maíz, vaina de frijol, algodón, (papa, tabaco, berenjena, sorgo); plaga general, esporádica; bellotero, elotero, heliothis.
301. *Hellula phidilealis* (Wlk.), Lep: Pyralidae; El Zamorano; larva en mayo; repollo, (lechuga); barrenador del tallo del repollo.
302. *Hermetia illucens* (Linn.), Diptera: Stratiomyidae; Comayagua, Tegucigalpa, La Paz, Catacamas, La Ceiba; adulto en mayo, junio, julio, octubre; toronjal; mosca soldada negra.
303. *Herpetogramma* (= *Pachyzancla*) *bipunctalis* (Fab.), Lep: Pyralidae; Comayagua, El Zamorano, Tegucigalpa; larva en febrero, agosto; remolacha; común, plaga esporádica; gusano de capullo del remolacha sureño.
304. *Heterotermes* sp., Isoptera: Rhinotermitidae; La Paz; obreros en septiembre; nido en elote de maíz.
305. *Hippodamia convergens* G. — M., Col: Coccinellidae; El Zamorano, Tegucigalpa, San Jerónimo, La Paz, Comayagua; adulto en marzo, abril, julio, agosto, octubre; larva en marzo; maíz (vegetativo), pepino, soya, chile, frijol (llenado de grano, madurez); depredador; catarinita.
306. *Homalodisca insolita* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Olancho, El Rosario, San Jerónimo; adulto en marzo, julio; arroz (vegetativo), maíz (madurez).

307. *Homalodisca vitripennis* (Ger.), Homop: Cicadellidae; Danlí, El Zamorano, Tegucigalpa; adulto en enero, febrero, agosto; cítricos.
308. *Hoplia* sp., Col: Scarabaeidae; Marcala, Siguatepeque; adulto en mayo; café, papa, rosas.
309. *Hortensia similis* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; La Lima, Comayagua, San Jerónimo, El Zamorano, Tegucigalpa, La Ceiba, Tela; adulto en enero, marzo, abril, mayo, julio, octubre; arroz (vegetativo, llenado de grano); frijol (vegetativo), higuera, vegetales, malezas; común; plaga esporádica, general, especialmente en arroz; lorito verde.
310. *Hyalymenus tarsatus* (Fab.), Hemip: Alydidae; Comayagua, El Rosario, El Zamorano, La Ceiba, Olancho; adulto en marzo, junio, julio, agosto; malezas, maíz (madurez).
311. "*Hylemya*" *platura* (Meigen), Diptera: Anthomyiidae; maíz, ajo; gusano de la semilla de maíz; es probable que *Delia* sea el género correcto.
312. *Hylesia* sp., Lep: Saturniidae; La Esperanza; larva en junio; maíz.
313. *Hypothenemus* (= *Stephanoderus*) *hampei* (Ferr.), Col: Scolytidae; La Trinidad; adulto, larva, y pupa en diciembre; en el grano de café; plaga seria; broca de café.
314. *Hypselonotus concinnus* Dallas, Hemip: Coreidae; arroz.
315. *Hypselonotus fulvus* DeG., Hemip: Coreidae; maíz, frijol.
316. *Hypselonotus punctiventris* Stal, Hemip: Coreidae; Choluteca, Comayagua; adulto en septiembre; camote.
317. *Hypselonotus* sp., Hemip: Coreidae; Olancho, Santa Bárbara, Tegucigalpa; adulto en marzo, julio, septiembre, diciembre; café, frijol.
318. *Icerya montserratensis* R. + H., Homop: Margarodidae; cítricos.
319. *Icerya purchasi* Mask., Homop: Margarodidae; cítricos; escama algodonosa.

320. *Icerya similis* Morr., Homop: Margarodidae; cítricos.
321. *Keiferia lycopersicella* (Walsh.), Lep: Gelechiidae; Comayagua, Yarumelo; adulto en febrero; larva en abril; tomate; común; plaga localizada, seria en poblaciones altas; enrollador de la hoja de tomate.
322. *Ladoffa sannionis* Young, Homop: Cicadellidae; Olancho, Comayagua; adulto en marzo; maíz (madurez); en reposo las alas quedan extendidas.
323. *Lagochirus araneiformis* (Linn.), Col: Cerambycidae; Danlí, Comayagua, El Zamorano, Barra Patuca; adulto en abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre; maíz.
324. "*Lamprosema*" (= *Hedylepta*) *indicata* (Fab.), Lep: Pyralidae; Danlí; larva en febrero; frijol; plaga potencial; el género correcto será cambiado a *Omiodes*.
325. *Largus* sp., Hemip: Largidae; Olancho, La Lima, La Trinidad, El Zamorano, Comayagua, Danlí; adulto en enero, febrero (en cópula), abril, julio, agosto, septiembre; chile, cítricos, sorgo, maíz (floración, madurez).
326. *Lasioderma serricorne* (Fab.), Col: Anobiidae; Tegucigalpa; adulto en noviembre; zanahoria, (granos almercenados y tabaco).
327. *Lebia* (cerca de *branchinoides* Reich.) sp., Col: Carabidae; Comayagua, El Rosario; adulto en julio, octubre; frijol (vegetativo), maíz (madurez); depredador.
328. *Lebia* sp., Col: Carabidae; Olancho, Tela, Comayagua; adulto en junio, julio, octubre; maíz, arroz (vegetativo); frijol (plántula, vegetativo); depredador.
329. *Lema sallaei* Jacoby, o muy cerca, Col: Chrysomelidae; Comayagua, San Jerónimo, Cortés, Catacamas; adulto en enero, agosto, octubre; arroz (vegetativo), chile dulce en las hojas.
330. *Lepidosaphes beckii* (Newm.), Homop: Diaspididae; cítricos; escama purpúrea.

331. *Lepiselaga crassipes* (Fab.), Diptera: Tabanidae; Comayagua, Cuyamel, Laguna de los Micos; adulto en mayo, agosto; en arrozal.
332. *Leptinotarsa undecimlineata* Stal, Col: Chrysomelidae; Comayagua, Siguatepeque, La Esperanza; adulto en marzo, agosto; ornamentales, papa-ayote asociado, (papa): plaga potencial.
333. *Leptodictya tabida* (H. — S.), Hemip: Tingidae; San Pedro Sula; adulto en diciembre; caña de azúcar.
334. *Leptoglossus* sp., Hemip: Coreidae; Laguna de los Micos; adulto en octubre; Chile.
335. *Leptoglossus zonatus* (Dallas), Hemip: Coreidae; Laguna de los Micos, Danlí, El Zamorano, Comayagua, El Rosario, Olancho, Erandique, Utila, San Pedro Sula, La Lima; ninfas en agosto; adulto en enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre; frijol, chupando fruta de Chile, ornamentales, maíz (floración), girasol, guayabo, cítricos, sorgo (madurez) tomate, pepino, (papa, banano, berenjena); común; plaga rara, general; chinche patona.
336. *Leptophobia aripa* (Boisd.), Lep: Pieridae; Tegucigalpa, El Zamorano, Siguatepeque, La Esperanza; adulto en junio, noviembre; larva en agosto, septiembre, octubre, diciembre; repollo, (lechuga); plaga esporádica, localizada.
337. *Lespesia archippivora* (Riley), Diptera: Tachinidae; El Zamorano; adulto en julio, agosto; parásito de *Ascia monuste* (pupa), también de una pupa en maíz.
338. *Leucania* sp., Lep: Noctuidae; San Jerónimo; larva en agosto; arroz (vegetativo).
339. *Leucophenga* sp., Diptera: Drosophilidae; El Zamorano; adulto en abril, mayo; maíz (floración).
340. *Leucoptera "coffeella"* (G. — M.), Lep: Lyonetiidae; San Pedro Sula; larva en febrero; minador de las hojas de cafeto.
341. *Ligyris* (= *Bothynus*) *nasutus* Burm., Col: Scarabaeidae; Comayagua, La Paz, El Rosario, El Zamorano, Olancho, San Pedro

- Sula; adulto en marzo, junio, julio, agosto; en el suelo de maíz (floración), frijol (antes de la siembra), (arroz, lechuga).
342. *Limnophora* sp. (sensu lato), Diptera: Muscidae; San Jerónimo; adulto en agosto; arroz (vegetativo).
343. *Liorhyssus hyalinus* (Fab.), Hemip: Rhopalidae; Cortés, Tegucigalpa; adulto en enero, marzo; vegetales; chinche hialina de los pastos.
344. *Litomastix* (= *Copidosoma*) sp. cerca de *truncatellus* (Dalman) (= *truncatella*), Hymenop: Encyrtidae; Comayagua, Tegucigalpa; adulto en enero, diciembre; larva y pupa en marzo; parásito de *Pseudophusia includens*, tal vez *Ascia monuste* también; parásito; común.
345. *Lobometopon* sp., Col: Tenebrionidae; La Esperanza; adulto en mayo; comiendo hojas de durazno; plaga.
346. *Loxa flavicollis* (Drury), Hemip: Pentatomidae; San José, Comayagua; adulto en enero, mayo, junio, septiembre; frijol, cítricos.
347. *Lygaeus circumlitus* (Stal), Hemip: Lygaeidae; Comayagua, La Paz, Danlí; adulto en enero, mayo, octubre; pepino (vegetativo).
348. *Lygaeus* sp., Hemip: Lygaeidae; La Esperanza, El Zamorano, Comayagua, Olancho, adulto en marzo, agosto, septiembre, octubre; frijol, papayo, maíz, chile.
349. *Lygaeus uhleri* (Stal), Hemip: Lygaeidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en mayo, octubre; maíz (floración).
350. *Lygus lineolaris* (P. de B.), Hemip: Miridae; Tegucigalpa, El Zamorano; adulto en marzo; vegetales, frijol (madurez); plaga potencial; chinche de las plantas.
351. *Macropygium* sp., Hemip: Pentatomidae; Catacamas; adulto en marzo; café.
352. *Macunolla intorta* Young, Homop: Cicadellidae; Catacamas; adulto en abril; soya.
353. *Macunolla ventralis* (= *Tettigella miniaticeps*) (Sig.), Homop: Cicadellidae; San Jerónimo, Tegucigalpa, Olancho, El Zamora-



- no; adulto en marzo, abril, mayo, julio, octubre; frijol (vegetativo), arroz (vegetativo), maní (floración), maíz, vegetales, cítricos.
354. *Manduca* (= *Protoparce*) *sexta* (Linn.), Lep: Sphingidae; La Paz, Comayagua, El Paraíso; adulto en febrero, mayo, junio; larva en marzo, junio; tomate, (papa, tabaco y otra solanácea); plaga rara en Honduras; gusano cornudo del tabaco.
355. *Mantispa* sp., Neuroptera: Mantispidae; El Zamorano; adulto en marzo; cítricos; depredador.
356. *Mareja anceps* (Fowler), Homop: Cicadellidae; Danlí, Comayagua; adulto en agosto, septiembre; frijol.
357. *Maruca testulalis* (Geyer), Lep: Pyralidae; Comayagua, Siguatepeque, La Ceiba, San Pedro Sula; adulto en mayo, agosto, septiembre; plaga potencial de frijol; gusano barranador de la vaina del frijol.
358. *Megacephala* (= *Tetracha*) sp., Col: Carabidae (=Cicindelidae); Olancho, Comayagua; adulto en junio; suelo de maizal, suelo de arrozal.
359. *Megascelia scalaris* (Lw.), Diptera: Phoridae; Comayagua; larva en agosto; criado de la elote de maíz.
360. *Megascelis puella* Lac. o muy cerca, Col: Chrysomelidae; Comayagua; adulto en septiembre; frijol (llenado de grano).
361. *Megascelis* sp., Col: Chrysomelidae; Lago Yojoa, Comayagua, Cortés, San Jerónimo; adulto en enero, mayo, julio, septiembre, octubre; gandul, frijol (vegetativo, llenado de grano); común.
362. *Meloe* sp., Col: Meloidae; Orica, La Esperanza; adulto en julio; maíz, frijol.
363. *Membracis mexicana* Guer., Homop: Membracidae; Danlí, Comayagua, Olancho, El Zamorano; adulto en febrero, abril, julio, agosto, noviembre; almendro, papa, mango, papayo, (melón); plaga rara, general.
364. *Metamasius hemipterus sericeus* (Oliver), Col: Curculionidae; La Lima; adulto en agosto; banano; picudo de la caña de azúcar.

365. *Micromyzus formosanus* (Takah.), Homop: Aphididae; ajo, cebolla.
366. *Micrutalis malleifera* Fowler, Homop: Membracidae; Comayagua; adulto en octubre; frijol (vegetativo).
367. *Mitrops dioxys* (Walk.), Homop: Dictyopharidae; San Jerónimo; adulto en julio, agosto, octubre; arroz (vegetativo), frijol (vegetativo).
368. *Mocis latipes* (= *repanda*) (Gn.), Lep: Noctuidae; Catacamas, San Pedro Sula, Laguna de los Micos, Juticalpa, Comayagua, La Paz, Tegucigalpa, El Zamorano, Danlí; adulto en marzo, junio, julio, agosto, noviembre; larva en junio, julio, agosto, noviembre; pupa en agosto, septiembre; criada de larvas comiendo hojas de arroz (vegetativo); pasto, sorgo, (maíz); falso medidor de los pastos; plaga esporádica, seria; la taxonomía de este grupo es difícil.
369. *Monolepta* sp., Col: Chrysomelidae; Lago Yojoa, Comayagua; adulto en junio; frijol, maíz, aguacate.
370. *Moodna bisinuella* Hamp., Lep: Pyralidae; Comayagua, San Jerónimo; larva en mayo, septiembre, octubre, noviembre; comen el pelo y el grano de la mazorca de maíz; se encuentra el gusano durante la cosecha de maíz.
371. *Morion* sp., Col: Carabidae; San Jerónimo; adulto en marzo; en el suelo de maizal; depredador.
372. *Mormidae pictiventris* Stal. Hemip: Pentatomidae; San Pedro Sula, Cuyamel, Tela, La Ceiba, Catacamas; adulto en mayo, agosto (en cópula), arroz (llenado de grano); plaga general, seria en la costa norte, una parte del complejo de chinches que atacan arroz; chinche hedionda negra de arroz.
373. *Mormidea* sp., Hemip: Pentatomidae; Santa Rosa de Copán; adulto en julio; frijol, (arroz).
374. cerca de *Mormidea* sp., Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, Tela, San Jerónimo; adulto en mayo, agosto; arroz (vegetativo, llenado de grano).

375. *Mormidea* sp. (cerca de *ypsilon* (Linn.)), Hemip: Pentatomidae; Comayagua, Santa Rosa de Copán, Olancho, Danlí; adulto en julio, octubre; maíz, soya (floración), frijol, arroz; plaga atacando el grano.
376. *Mormidea ypsilon* (Linn.), Hemip: Pentatomidae; maíz.
377. *Murgantia histrionica* (Hahn.), Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, San Pedro Sula, Comayagua, Tegucigalpa; adulto en febrero, mayo, julio; maíz, repollo, papa, ayote, malezas; chinche harlequin.
378. *Musca doméstica* Linn., Diptera: Muscidae; El Zamorano, Tegucigalpa; adulto en mayo, septiembre; repollo, semilla de papaya; mosca casera.
379. *Myzus persicae* (Sulzer), Homop: Aphididae; chile negro, papa, brócoli, repollo, cebolla, melón, pepino, tomate, sandía; vector de virus; plaga; áfido verde de durazno.
380. *Nabis capsiformis* (Germ.), Hemip: Nabidae; depredador; chinche damisela pálida.
381. *Neoconocephalus nietoi* (Sauss.) o muy cerca, Orthop: Tettigoniidae; Comayagua, San Jerónimo, El Zamorano, Tegucigalpa, La Lima; adulto en febrero, abril, mayo, junio, octubre; ninfas en septiembre; maíz (vegetativo, floración), arroz (vegetativo); común.
382. *Nephelodes emmedonia* Cramer, Lep: Noctuidae; maíz; falta confirmación de la existencia de esta especie en Honduras.
383. *Nezara viridula* (Linn.), Hemip: Pentatomidae; Choluteca, Comayagua, Danlí; adulto en enero, febrero, marzo, octubre; ninfa en febrero, noviembre; frijol, soya, higuera, pepino, malezas (*Mimosa pigra*), (papa, repollo, maíz, arroz, algodón, berenjena, tomate); plaga esporádica, general; chinche verde sureña.
384. *Nodonota* sp. (cerca de *atra* Har.), Col: Chrysomelidae; San Jerónimo; adulto en junio; arroz (plántula).
385. *Nodonota* sp. (cerca de *cretifera* Lef.), Col: Chrysomelidae; La Paz; maíz (llenado de grano).

386. *Nodonota* sp., Col: Chrysomelidae; La Esperanza, Danlí, La Ceiba, Comayagua, San Jerónimo, La Lima; adulto en enero, mayo, junio, agosto, octubre; frijol (vegetativo), maíz, arroz, (vegetales); plaga general, seria en poblaciones altas.
387. *Ochrostomus poeyi* (Guer.), Hemip: Lygaeidae; banano.
388. *Ochterus perbosci* (Guer.), Hemip: Ochteridae; Laguna de los Micos, Tela, San Jerónimo; adulto en junio, agosto; arroz; común.
389. *Oebalus insularis* (Stal), Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, Tela, Cuyamel, Laguna de los Micos; adulto en mayo, agosto, octubre; arroz (llenado de grano); parte de un complejo de chinches que atacan arroz; chinche hediondo de las espigas de arroz.
390. *Oebalus* (= *Solubea*) *pugnax* (Fab.), Hemip: Pentatomidae; San Jerónimo; ninfa y adulto en agosto; adulto en septiembre, octubre; arroz (vegetativo, llenado de grano), (sorgo); parte de un complejo de chinches que ataca arroz; chinche apestosa de arroz.
391. *Oebalus* (cerca de *poecilus* (Dallas)) sp., Hemip: Pentatomidae; La Ceiba, Laguna de los Micos, Tela, Cuyamel, Comayagua, San Jerónimo; adulto en mayo, junio, julio, octubre; arroz (llenado de grano).
392. *Oedancala bimaculata* (Dist.), Hemip: Lygaeidae; frijol.
393. *Oedionychus seriatus* Baly, Col: Chrysomelidae; Olancho; adulto en mayo, junio; ajonjolí, maíz.
394. *Oedionychus* sp., Col: Chrysomelidae; Comayagua, Olancho; adulto en junio, julio; maíz, ajonjolí.
395. *Oedionychus* sp. (cerca de *actangulus* Jacoby), Col: Chrysomelidae; La Esperanza, Olancho; adulto en mayo, agosto; vegetales, flores (*Antirrhinum majus* L.).
396. *Oedionychus* (= *Alagoasa*) sp. (cerca de *decemguttatus* Fab.), Col: Chrysomelidae; Comayagua; adulto en mayo, junio, agosto;

- ajonjolí, maíz (madurez); plaga esporádica en ajonjolí, localizada.
397. *Oedionychus* sp. (cerca de *hypocrita* Jacoby), Col: Chrysomelidae; Choluteca, El Zamorano, Comayagua; adulto en julio, septiembre, noviembre; ajonjolí; plaga seria, general.
398. *Oedionychus virgatus* Har. o cerca, Col: Chrysomelidae; Comayagua; adulto en junio; ajonjolí.
399. *Oliarus* sp., Homop: Cixiidae; El Zamorano, Comayagua, La Lima, Olancho; adulto en enero, marzo, mayo, agosto; maíz (plántula), pepino, (pasto).
400. *Omalodes* sp., Col: Histeridae; La Lima; adulto en agosto; cocotero.
401. *Omophoita aequinoctialis* (Linn.), Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa, San Jerónimo, Choluteca, Comayagua, La Ceiba; adulto en junio, agosto, septiembre, diciembre; arroz (vegetativo, llenado de grano), vegetales, (frijol, cebolla); tortuguilla colorosa; plaga rara, seria en poblaciones altas.
402. *Omophoita simulans* Jacoby, Col: Chrysomelidae; frijol.
403. *Omophoita* sp., Col: Chrysomelidae; Jamastrán, La Lima, San Jerónimo, El Zamorano, La Ceiba, Laguna de los Micos; adulto en agosto, septiembre, octubre; maíz, arroz (vegetativo, llenado de grano), (frijol).
404. *Oncideres ocellaris* Bates, Col: Cerambycidae; Santa Bárbara; adulto en septiembre; árbol de sombra en café.
405. *Oncometopia clarior* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; El Zamorano, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Olancho, Danlí; adulto en enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre; frijol (llenado de grano), soya (floración), pepino; común.
406. *Oncometopia* sp., Homop: Cicadellidae; frijol, maíz.
407. *Ophion flavidus* Brulle, Hymenop: Ichneuemonidae; Comayagua; adulto en junio; parásito de *Spodoptera frugiperda*.

408. *Ophion* sp., Hymenop: Ichneuemonidae; Comayagua, La Paz; adulto en julio, agosto; criado de pupa de *Anticarsia gemmatalis* en soya, de una pupa de Hesperidae en arroz; parásito.
409. *Ornidia* (= *Volucella*) *obesa* (Fab.), Diptera: Syrphidae; Comayagua, El Zamorano, Danlí, Cortés; adulto en enero, mayo, junio, julio; maizal, cafetal.
410. *Orphula* sp., Orthop: Acrididae; La Esperanza, Tela, Comayagua, El Rosario, San Jerónimo, Barra Patuca, Cedeño; adulto en febrero, marzo, mayo, julio, agosto, noviembre, octubre; malezas, cítricos, arroz (plántula, vegetativo), frijol (plántula); común.
411. *Osbornellus* sp., Homop: Cicadellidae; Tegucigalpa; adulto en enero; alfalfa.
412. *Oxygona acutangula* Chev., Col: Chrysomelidae; Danlí, El Paraíso; adulto en junio, julio; frijol.
413. *Oxygona* sp., Col: Chrysomelidae; El Zamorano, El Paraíso; adulto en junio, julio; frijol, leguminosas.
414. *Oxysarcodexia ochripyga* (Wulp), Diptera: Sarcophagidae; El Zamorano; adulto en mayo; maíz (floración).
415. *Oxysarcodexia* sp., Diptera: Sarcophagidae; San Jerónimo; adulto en julio; arroz (vegetativo).
416. *Pachybrachius bilobatus* (Say), incluyendo *P. b. scutellatus* (Dallas), Hemip: Lygaeidae; Danlí, Tegucigalpa, El Zamorano, Olancho; adulto en marzo, abril, mayo; chile, repollo, vegetales, maíz (floración), (papa).
417. *Paederus* sp., Col: Staphylinidae; El Zamorano; adulto en marzo; maíz (floración); depredador.
418. *Palaeosepsis scabra* (= *haemorrhoidalis*) (Loew.), Diptera: Sepsidae; Tegucigalpa; adulto en octubre; vegetales, guayabo.
419. *Panchlora* sp., Orthop: Blattidae; Choloma; adulto en julio; cafetal.

420. *Panoquina* sp., Lep: Hesperiiidae; Comayagua, Laguna de los Micos; larva en agosto, pupa en septiembre; arroz; enrollador de las hojas; común en la costa norte.
421. *Papilio anchisiades idaeus* Fab., Lep: Papilionidae; El Zamorano; larva en septiembre; criado de cítricos; plaga.
422. *Papilio* (= *Heraclides*) *crephontes* Cramer, Lep: Papilionidae; El Zamorano, La Ceiba; adulto en marzo, abril, julio; larva en agosto; cítricos; perrito de los cítricos, fácilmente confundido con *Papilio thoas*.
423. *Papilio polyxenes* Fab., Lep: Papilionidae; Danlí El Zamorano; larva en junio; perejil; gusano de perejil.
424. *Papilio* (= *Heraclides*) *thoas* Linn., Lep: Papilionidae; El Zamorano, La Ceiba, Juticalpa; adulto en mayo, julio; criado de cítricos; perrito sureño de los cítricos, confundido con *Papilio crephontes*.
425. *Paralimna* sp. (sensu lato), Diptera: Ephydriidae; San Jerónimo; adulto en agosto; arroz (vegetativo).
426. *Parachartegus apicalis* Fab., Hymenop: Vespidae; El Zamorano, La Ceiba; adulto en marzo, mayo, junio; cocotero, maní (floración).
427. *Paromius longulus* (Dallas), Hemip: Lygaeidae; San Jerónimo, La Paz; adulto en mayo, julio, septiembre; soya, arroz (vegetativo, llenado de grano), (maíz, pasto).
428. *Pasimachus rodriguezi* Putz., Col: Carabidae; Talanga, El Zamorano, La Paz; adulto en junio; maíz (llenado de grano); depredador.
429. *Pasimachus* sp. (cerca de *cordicollis* Chaud.), Col: Carabidae; La Ceiba, Olancho, Comayagua; adulto en mayo, junio, diciembre suelo de maizal; depredador.
430. *Passalus punctiger* Serv., Col: Passalidae; La Lima; adulto en agosto; cocotero.
431. *Pediobius* sp., Hymenop: Eulophidae; San Jerónimo; adulto en agosto; parásito de la pupa de *Mocis latipes* en arroz (vegetativo)

432. *Pentilia nigella* Ws., Col: Coccinellidae; Tegucigalpa; adulto en agosto; cítricos; depredador.
433. *Pentilia* sp., Col: Coccinellidae; Valle de Siria; adulto en septiembre; cítricos; depredador.
434. *Peridroma saucia* (Hbn.), Lep: Noctuidae; papa, chile; gusano cortador variado.
435. *Phanaeus* sp., Col: Scarabaeidae; San Jerónimo; adulto en agosto; suelo de arrozal; no daño.
436. *Phera obtusifrons* Fowler, Homop: Cicadellidae; El Rosario; adulto en junio; maíz (floración).
437. *Phlugis mantispa* (Bol.), Orthop: Tettigoniidae; Comayagua, Tela, Olancho; adulto en marzo, mayo; maíz (madurez), arroz (llenado de grano).
438. *Phloeotribus* sp., Col: Scolytidae; La Esperanza; adulto en marzo; durazno.
439. *Phobetrion hipparchia* (Cramer), Lep: Limacodidae (=Eucleidae, Cochlidiidae); El Zamorano; larva en octubre; criado de cítricos.
440. *Photinus* sp., Col: Lampyridae; Yoro; adulto en junio; cafetal.
441. *Photuris* sp., Col: Lampyridae; Tela, La Lima, La Esperanza, San Jerónimo, Comayagua, El Zamorano; adulto en mayo, junio, julio, agosto; arroz (vegetativo), maíz (madurez).
442. *Phthia picta* (Drury), Hemip: Coreidae; maíz, papa, arroz, tomate, camote, berenjena.
443. *Phthorimaea operculella* (Zeller), Lep: Gelechiidae; camote, papa; gusano del tubérculo de la papa.
444. *Phyllophaga elenans* Sayl., Col: Scarabaeidae; adulto en marzo, mayo; larva en marzo; pasto; suelo en un jardín; gallina ciega.
445. *Phyllophaga yucateca* (Bates), Col: Scarabaeidae; Comayagua; adulto en marzo, mayo; adulto en el suelo de maíz antes de la siembra; gallina ciega.



446. *Phyllophaga* sp., Col: Scarabaeidae; Choloma, La Ceiba, El Zamorano, Olancho; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, junio; larva en junio, octubre; arroz (en las raíces), (papa, frijol, maíz, lechuga, cebolla, sorgo, tomate, trigo, camote, chile); plaga seria, localizada, esporádica.
447. *Phyllotreta fallaciae* (Csiki), Col: Chrysomelidae; frijol.
448. *Phyllotreta* sp. (cerca de *fallaciae* (Csiki)), Col: Chrysomelidae; Comayagua, Tegucigalpa, Danlí, Santa Rosa de Copán; adulto en enero, marzo, mayo, noviembre; papayo (vegetativo), vegetales.
449. *Phyrdenus muriceus* (Germ.), Col: Curculionidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en enero, noviembre, diciembre; tomate, (chile, papa); adulto y larvas atacan las raíces y los tallos; plaga rara, localizada.
450. *Physonota alutacea* Bohn., Col: Chrysomelidae; Comayagua, La Paz; adulto en junio, julio; maíz (vegetativo, llenado de grano), (frijol).
451. *Physonota attenuata* Bohn. o muy cerca, Col: Chrysomelidae; Comayagua, La Paz; adulto en mayo, junio; en maíz pero la larva se alimenta de *Cordia dentata*.
452. *Piezodorus guildinii* (West.), Hemip: Pentatomidae; Olancho, Comayagua; adulto en marzo; alfalfa, (arroz).
453. *Pinophilus* sp., Col: Staphylinidae; Olancho; adulto en junio; suelo de maizal; depredador.
454. *Planococcus citri* (Risso), Homop: Pseudococcidae; cítricos, cafeto, mango, melón, papayo; chinche harinosa de los cítricos.
455. *Plodia interpunctella* (Hbn.), Lep: Pyralidae; La Ceiba, Catacama; adulto y larva en marzo; pupa en abril; grano de maíz almacenado; plaga; palomilla de los granos.
456. *Plutella xylostella* (= *maculipennis*) (Linn.), Lep: Plutellidae (= Yponomeutidae); Jamastrán, El Zamorano, Santa Rosa de Copán, Comayagua; adulto en enero, junio, julio, agosto; larva

- en enero, octubre; repollo, (remolacha); plaga seria, general; palomilla dorso de diamante.
457. *Pococera* sp., Lep: Pyralidae; Comayagua, Choluteca; larva en junio, julio; grano de maíz, girasol, higuierilla; plaga esporádica, seria en sorgo; panoja de sorgo; asociado con *Pyroderces*, los dos hacen el mismo daño.
458. *Poekilloptera phalaenoides* (Latr.), Homop: Flatidae; Comayagua; adulto en febrero; guanacaste, malezas (*Mimosa pigra*).
459. *Polistes instabilis* Saus., Hymenop: Vespidae; San Pedro Sula, Intibucá, El Zamorano, Comayagua, La Paz; adulto en marzo, abril, mayo, julio; flores de chile, maíz (floración); polinizador, puede ser depredador.
460. *Polistes* sp., Hymenop: Vespidae; La Paz, Comayagua, El Zamorano, La Ceiba; adulto en abril, marzo, abril, julio, agosto; maíz (floración), chile (llenado de grano).
461. *Polybia occidentalis* (Oliv.), Hymenop: Vespidae; La Paz, La Ceiba, El Zamorano, Comayagua; adulto en enero, abril, mayo, julio, agosto; maíz (floración), arroz (vegetativo), frijol (llenado de grano); depredador.
462. *Polygrammodes* (= *Sylepta*) *elevata* (Fab.), Lep: Pyralidae; La Lima, Comayagua; adulto en mayo, agosto, octubre; plaga potencial en camote.
- 463 *Prepops* (= *Resthenia*, *Opistheuria*, *Platytylellus*) *latipennis* (Stal), Hemip: Miridae; Comayagua, La Paz, El Zamorano, Olancho, Catacamas, Danlí, La Ceiba, La Lima; adulto en enero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre; frijol (plántula), arroz (vegetativo), maíz, ajonjolí, sorgo, soya (vegetativo), alfalfa; común; plaga potencial, general; chinche negro de frijol.
464. *Prepops* sp., Hemip: Miridae; Tela, El Zamorano; adulto en mayo, octubre; frijol (plántula), arroz (llenado de grano).
465. *Prosapia simulans* (Wlk.), Homop: Cercopidae; Danlí, Olancho, Utila, El Zamorano, Tela, La Lima, La Esperanza, Comayagua, San Pedro Sula; adulto en enero, febrero, marzo, mayo, julio,

- octubre; maíz (plántula, vegetativo), pasto, frijol, (hierbas); común; salvazo rayado.
466. *Prosapia* sp., Homop: Cercopidae; Tela, San Jerónimo; adulto el marzo, agosto, octubre; arroz (vegetativo), pasto, (hierbas).
467. *Prostephanus truncatus* (Horn), Col: Bostrichidae; granos almacenados; barrenador del grano mayor.
468. *Proxys punctulatus* (P. de B.), Hemip: Pentatomidae; San Pedro Sula, San Jerónimo, Danlí, El Zamorano; adulto en febrero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre; vegetales, maíz (floración), espiga de arroz; común.
469. *Pselliopus* sp., Hemip: Reduviidae; San Pedro Sula, La Paz; adulto en julio, agosto; soya.
470. *Pseudaletia* (= *Cirphis*) *unipuncta* (Haw.), Lep: Noctuidae; maíz, arroz, trigo, pasto; gusano soldado.
471. *Pseudococcus* sp., Homop: Pseudococcidae; papa, aguacate, cítricos.
472. *Pseudomyrmex* sp. prob. *gracilis* (F.), Hymenop: Formicidae; La Ceiba; obrero en junio; cítricos.
473. *Pseudoplusia includens* (Wlk.), Lep: Noctuidae; Comayagua, La Lima, Danlí, Santa Rosa de Copán, El Zamorano, Jamastrán; adulto en enero, febrero, julio, septiembre, octubre, diciembre; larva en julio, noviembre, diciembre; en *Solanum americanum*, frijol, hoja de tomate, repollo, (maíz); las larvas sin patas negras confundido con *Trichoplusia ni* y *Autoplusia egena*; las larvas tienen un alto nivel de parásitos; adultos son migratorios; común; plaga general, seria en poblaciones altas, esporádicas; falso medidor del soya; falso medidor con patas negras.
474. *Ptecticus testaceus* (Fab.), Diptera: Stratiomyidae; San José; adulto en agosto; naranjas.
475. *Ptiloglossa mayarum* Cock., Hymenop: Colletidae; Comayagua; adulto en noviembre; semilleros.

476. *Pyrgocorypha uncinata* (Harris), Orthop: Tettigoniidae; El Rosario, Comayagua; adulto en junio; ninfa en septiembre; cogollo de maíz (floración).
477. *Pyroderces* (= *Sathrobrot*) sp. (prob. *rileyi* (Wlsm.)), Lep: Cosmopterigidae; Choluteca, Comayagua; larva en julio, noviembre; panoja de sorgo, elote de maíz; plaga asociado con *Pococera* sp.; gusano barrenador rosado.
478. *Pyrota decorata* Haag., Col: Meloidae; Comayagua; adulto en septiembre, octubre, noviembre; el adulto come la flor y hoja de frijol, (papa); plaga seria, esporádica, localizada.
479. *Pyrrhopyge chalybea* (Scudder), Lep: Hesperiiidae; Tegucigalpa, El Zamorano; adulto en enero, febrero, abril, agosto; larva en febrero; aguacate; enrollador de la hoja en aguacate.
480. *Rasahus hamatus* (Fab.), Hemip: Reduviidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en febrero; zanahoria; depredador.
481. *Ravinia effrenata* (Wlk.), Diptera: Sarcophagidae; San Jerónimo; adulto en junio; arroz (vegetativo).
482. *Repipta taurus* (Fab.), Hemip: Reduviidae; Comayagua, El Zamorano, Olancho; adulto en mayo, septiembre, octubre; arroz, sorgo (madurez), maíz (floración); depredador.
483. *Rhabdotus* sp., Hymenop: Ichneumonidae; San Jerónimo; adulto en julio; parásito de una pupa de la familia Hesperiiidae en arroz (vegetativo).
484. *Rhopalosiphum* (= *Aphis*) *maidis* (Fitch), Homop: Aphidae; Comayagua, El Rosario; adultos en julio; maíz (llenado de grano), (caña de azúcar, arroz, sorgo, graminaceas en general); plaga; áfido de la hoja de maíz.
485. *Rhynchophorus palmarum* (Linn.), Col: Curculionidae; Comayagua, La Ceiba, Juticalpa; adulto en febrero, abril, junio, noviembre; larva en febrero; troncos de cocotero, troncos de papaयो cortados, (piña); plaga esporádica, seria, puede matar la planta; picudo de la palma de coco.

486. *Rhyzopertha dominica* (Fab.), Col: Bostrichidae; Puerto Cortés, Choluteca; adulto en marzo, junio; arroz (grano), sorgo (grano); plaga esporádica, seria; barrenador menor de los granos.
487. *Rogas* sp., Hymenop: Braconidae; Siguatepeque, Comayagua; adulto en febrero, junio, julio; parásito de *Mocis latipes* y *Spodoptera frugiperda*.
488. *Rogas vaughni* Mues., Hymenop: Braconidae; San Jerónimo; adulto en julio; parásito de *Spodoptera frugiperda* (larva) en arroz (vegetativo).
489. *Rupela albinella* (Cramer), Lep: Pyralidae; Comayagua, El Zamorano; adulto en noviembre; arroz; plaga potencial; novia del arroz.
490. *Sagotylus confluentus* (Say), Hemip: Coreidae; arroz, maíz, pasto.
491. *Sagotylus triguttatus* (H. — S.), Hemip: Coreidae; Utila, San Pedro Sula, Tegucigalpa; adulto en enero, abril, diciembre; tomate, malezas.
492. *Saissetia coffeae* (Wlk.), Homop: Coccidae; aguacate, café, cítricos; escama hemisférica.
493. *Schistocerca americana* (Drury), Orthop: Acrididae; La Lima; adulto en junio; ataca muchas plantas; saltamonte americano.
494. *Schistocerca* ‘*cancellata*’ (Serv.), Orthop: Acrididae; frijol, maíz.
495. *Schistocerca* sp., Orthop: Acrididae; frijol, maíz.
496. *Scudderia furcata* (Brunner), Orthop: Tettigoniidae; Santa Rosa de Copán; adulto en noviembre; tabaco.
497. *Selenophorus* spp., Col: Carabidae; El Zamorano, San Jerónimo, Comayagua, La Paz, Olancho, Tegucigalpa; adulto en marzo, mayo, junio, diciembre; suelo de maizal, suelo de arrozal, arroz (vegetativo); común; depredador.
498. *Sibovia compta* (Fowler), Homop: Cicadellidae; San Jerónimo; adulto en octubre, frijol (vegetativo).

499. *Sibovia occatoria* (Say), Homop: Cicadellidae; aguacate, cítricos
500. *Sibovia* sp., Homop: Cicadellidae; Danlí Tegucigalpa, La Paz, El Zamorano, Juticalpa; adulto en marzo, junio, julio, septiembre, octubre; pasto, alfalfa, soya (floración), frijol (vegetativo), maní (floración); común.
501. *Silba* (= *Carpolonchaea*) sp. (tal vez *pendula* (Bezzi) o *glabberima* (Wied.)), Diptera: Lonchaeidae; San Pedro Sula, Comayagua; adulto en julio, octubre; yuca, aguacate, (cítricos); mosca de la yuca.
502. *Sipha flava* (Forbes), Homop: Aphidae; pasto; áfido amarillo de la caña de azúcar.
503. *Sitophilus granarius* (Linn.), Col: Curculionidae; granos almacenados; plaga; picudo de los granos.
504. *Sitophilus oryzae* (Linn.), Col: Curculionidae; granos almacenados; confundido con *Sitophilus zeamais*; plaga; picudo de arroz.
505. *Sitophilus zeamais* Mots., Col: Curculionidae; Choluteca, El Zamorano, Olancho, Catacamas, Comayagua, La Ceiba, Tegucigalpa; adulto en febrero, marzo, abril, mayo, octubre; maíz (en el campo, grano almacenado); sorgo (grano), arroz (grano); plaga muy seria en el mercado y en la bodega; plaga seria, general; confundido con *Sitophilus oryzae*; picudo de maíz.
506. *Sitotroga cerealella* (Oliv.), Lep: Gelechiidae; Choluteca; larva en abril, mayo; sorgo (grano), (granos almacenados); plaga esporádica; polilla de los granos.
507. *Sogatodes* (= *Sogata*) *orizicola* (= *oryzicola*) (Muir.), Homop: Delphacidae; El Zamorano, Comayagua; adulto en octubre; arroz; delphacido del arroz.
508. *Spartocera fusca* (Thunberg), Hemip: Coreidae; Talanga; adulto en julio; papa.
509. *Sphingolabis* (= *Doru*) *taeniata* (= *taeniatum*, *lineare*) (Dohrn), Dermap: Forficulidae; La Ceiba, La Lima, Tela, El Rosario, San Jerónimo, Comayagua, El Zamorano, Catacamas; adulto

- en abril, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre; maíz (floración, madurez), en el cogollo, en elote dañado, arroz (vegetativo, llenado de grano), (camote); omnívoro, puede ser depredador; común; general; tal vez *Doru* es el género correcto de este insecto.
510. *Sphongophorus inflatus* Fowler, Homop: Membracidae; Tegucigalpa; adulto en junio; ornamentales.
511. *Spilochalcis* sp., Hymenop: Chalcididae; El Zamorano; adulto en mayo; parásito de *Plutella xylostella*.
512. *Spissistilus festinus* (Say), Homop: Membracidae; La Ceiba, Comayagua, Laguna de los Micos, La Paz, San Jerónimo, El Zamorano, Olancho, Catacamas; adulto en marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre; frijol (vegetativo, madurez) arroz (vegetativo), tomate, maíz, soya (floración), (papa, pasto); común; periquito tricornudo.
513. *Spodóptera* (= *Prodenia*) *dolichos* (Fab.), Lep: Noctuidae; Comayagua; adulto en junio; (papa).
514. *Spodóptera* (= *Xylomyges*) *eridania* (Cramer), Lep: Noctuidae; El Zamorano; maíz (sandía, frijol, lechuga, cebolla, tomate); gusano soldado sureño.
515. *Spodoptera* (= *Laphygma*) *exigua* (Hbn.), Lep: Noctuidae; Comayagua, El Zamorano, Tegucigalpa; La Ceiba; adulto en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio; larva en abril, marzo, mayo, agosto; frijol (plántula), repollo, tomate, maíz (plántula), lechuga en el mercado; plaga esporádica; gusano soldado de la remolacha.
516. *Spodoptera* (= *Laphygma*) *frugiperda* (Smith), Lep: Noctuidae; La Paz, El Rosario, San Jerónimo, Comayagua, Olancho, Danlí, El Zamorano, San Pedro Sula, La Esperanza; adulto en febrero, mayo, junio, julio, octubre; larva en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre; maíz (todas las etapas), en las hojas (especialmente en el cogollo), los tallos, las elotes, en el suelo como cortador, arroz, chile, repollo, fruta de tomate, sorgo, zacate, cebolla, frijol, (remolacha, lechuga, ajo, papa); plaga general, sería especialmente en hortalizas y en etapas críticas de maíz; gusano cogollero de maíz.

517. *Spodoptera* (=Prodenia) *latifascia* (Wlk.), Lep: Noctuidae; Olancho, Danlí, El Zamorano, Comayagua, La Esperanza; adulto en marzo, abril, junio, octubre, diciembre; larva en enero, mayo, junio, julio, octubre, noviembre, diciembre; frijol, fruta de chile, ornamentales (*Althea*), girasol, soya, algodón, cebolla, maíz (plántula), ajonjolí, (sandía, lechuga, tomate); plaga seria; la forma negra es el gusano negro; gusano Prodenia (en parte).
- 518 *Spodoptera* (=Xylomyges) *sunia* (Gn.), Lep: Noctuidae; Danlí, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua, San Jerónimo, El Zamorano, Choluteca; adulto en febrero, marzo, abril, mayo, junio, diciembre; larva en febrero, abril, mayo, junio, julio; maíz (plántula), sorgo, soya (vegetativo, llenado de grano), fruta de tomate; cortador en tomate, prob. en flor de algodón; adulto descansando en el cogollo de agave; arroz (vegetativo), repollo; plaga seria; gusano soldado de la mancha blanca.
519. *Spodoptera* (=Prodenia) *ornithogalli* (Gn.), Lep: Noctuidae; Comayagua; adulto en julio; larva en julio; ornamentales, (maíz); gusano soldado de las franjas amarillas.
520. *Spodoptera* spp., Lep: Noctuidae; frijol, remolacha, melón, zanahoria, chayote, pepino, lechuga, cebolla, arroz, ayote, sorgo, tomate, sandía; plaga.
521. *Stator* sp., Col: Bruchidae; frijol (seco).
522. *Stenoma catenifer* Walsm., Lep: Stenomidae (=Oecophoridae, Stenomatinae); aguacate.
523. *Stenocrates* sp., Col: Scarabaeidae; Tegucigalpa, Tela; adulto en enero, julio; ornamentales.
524. *Symphylus deplanatus* (H. — S.), Hemip: Scutelleridae; maíz.
525. *Synoeca surinama* (Linn.), Hymenop: Vespidae; La Ceiba, La Lima, El Zamorano; adulto en septiembre; arroz, (banano, mango).
526. *Systema s-littera* Linn., Col: Chrysomelidae; papa, frijol, pasto.
527. *Systema* sp., Col: Chrysomelidae; Tegucigalpa; adulto en marzo; vegetales.



528. *Taeniptera lasciva* (Fab.), Diptera: Micropezidae (=Tylidae); Comayagua; adulto en marzo, septiembre; camote.
529. *Taeniopoda centurio* (Drury), Orthop: Acrididae; Comayagua, El Zamorano, San Pedro Sula, Nueva Ocotepeque; adulto en julio, agosto; pasto, maíz; plaga rara, localizada.
530. *Taenipoda varipennis* Rehn, Orthop: Acrididae; La Ceiba, Cuyamel; adulto en marzo, mayo; yuca; plaga rara, localizada.
531. *Tenebroides mauritanicus* (Linn.), Col: Trogositidae (=Ostomidae); La Lima; adulto en junio; granos de maíz, (granos almacenados).
532. *Tetanops* sp. (poss. nueva), Diptera: Otitidae; Comayagua; adulto en junio; maíz.
533. *Thrips tabaci* Lind., Thysanoptera: Thripidae; cebolla, coliflor, repollo, frijol, pepino, melón, tomate, ajo; plaga seria en cebolla trips de la cebolla.
534. *Thyanta perditor* (Fab.), Hemip: Pentatomidae; El Zamorano, Tegucigalpa, La Paz, Comayagua, Catacamas; adulto en enero, mayo, junio, julio, agosto; soya, frijol (madurez).
535. *Thyanta* sp. o cerca, Hemip: Pentatomidae; La Lima, Comayagua Danlí; adulto en agosto, septiembre; arroz, frijol.
536. *Thionia* sp., Homop: Issidae; La Paz, El Rosario; adulto en julio; maíz.
537. *Tomaspis inca* (G. — M.), Homop: Cercopidae; El Rosario, Comayagua, San Pedro Sula, Jamastrán, Tegucigalpa; adulto en junio, julio, agosto, octubre; maíz (floración, llenado de grano), pasto, (papayo).
538. *Toxomerus politus* (Say), Diptera: Syrphidae; El Zamorano, El Rosario, Comayagua, La Lima; adulto en agosto; maíz (llenado de grano), frijol (llenado de grano), sorgo, arroz; común; depredador.
539. *Toxomerus* sp., Diptera: Syrphidae; El Rosario; larva y pupa en junio; maíz (llenado de grano), sorgo (vegetativo), larva comiendo áfidos; depredador.

540. *Toxoptera aurantii* (Fonsc.), Homop: Aphidae; cítricos, cafeto; áfido negro de los cítricos.
541. *Toxotrypana curvicauda* Gerst., Diptera: Tephritidae; Tegucigalpa, El Zamorano, Cortés; larva en diciembre; adulto en junio, diciembre; papaya; plaga seria; general; mosca de la fruta de papaya.
542. *Trialeurodes vaporariorum* (West.), Homop: Aleyrodidae; frijol.
543. *Triaspis azteca* Martin, Hymenop: Braconidae; Danlí; parásito de *Apion godmani*.
544. *Tribolium castaneum* (Herbst.), Col: Tenebrionidae; La Ceiba, Choluteca, El Zamorano; larva, pupa, y adultos en marzo; adulto en noviembre; sorgo (grano), harina, maíz, (granos almacenados); plaga; escarabajo rojo de la harina.
545. *Tribolium confusum* duVal., Col: Tenebrionidae; granos almacenados; plaga potencial en Honduras; gorgojo confuso de la harina.
546. *Trichoplusia ni* (Hbn.), Lep: Noctuidae; La Lima, Tegucigalpa, El Zamorano; larva en enero; repollo, criado de lechuga, (algodón, melón, sandía, pepino, ayote); plaga esporádica; confundido con *Pseudoplusia includens*, migratorio; falso medidor de repollo.
547. *Trigona corvina* (Cock.), Hymenop: Apidae; San Pedro Sula, La Ceiba, La Lima, La Esperanza, Comayagua, El Zamorano; adulto en marzo, mayo, junio, julio, agosto; leguminosa, algodón, maíz; polinizador.
548. *Trigona silvestriana* Vach., Hymenop: Apidae; mango, banano; plaga en banano ya que transmite Moko; polinizador en mango.
549. *Tropidacris* sp., Orthop: Acrididae; Taulabé, Comayagua, Olanchito; adulto en julio; ninfa en marzo; pino, maíz; plaga seria, rara, localizada.
550. *Tryptherus* sp., Col: Cantharidae; La Paz, El Rosario, Comayagua, Tela, La Ceiba; adulto en mayo, junio (en cópula); arroz (llenado de grano), maíz (floración, llenado de grano, madurez), soya; común.

551. *Tylozygus fasciatus* (Wlk.), Homop: Cicadellidae; Tela, Olancho; adulto en julio, septiembre; arroz (vegetativo), (maíz).
552. *Typophorus* (= *Tymnes*) sp., Col: Chrysomelidae; La Ceiba, Utila, Comayagua; adulto en enero, julio, septiembre; vivero de cítricos, maíz, camote, arroz, (papa).
553. *Typophorus nigrinus* Fab., Col: Chrysomelidae; Comayagua; adulto en junio; maíz; tortugilla del camote.
554. *Umbonia* sp., Homop: Membracidae; Olancho, El Zamorano, Siguatepeque; adulto en enero, febrero, marzo; soya (madurez).
555. *Unaspis citri* (Comstock), Homop: Diaspididae. cítricos; escama nieve de los cítricos.
556. *Urbanus* (= *Eudamus*) *proteus* (Linn.), Lep: Hesperidae; Comayagua, Jamastrán; adulto en julio, agosto; larva en agosto, octubre, diciembre; enrollador de las hojas, frijol, soya; plaga en poblaciones altas; migratorio; gusano cabezón del frijol.
557. *Vestistilus testaceus* (Fair.), Homop: Membracidae; Comayagua, San Marcos; adulto en enero, abril, julio, agosto; maíz, cafeto, arroz (vegetativo).
558. *Willistoniella pleuropunctata* (Weid.), Diptera: Ropalomeridae; San José; adulto en julio; cítricos.
559. *Xenochalepus signaticollis* (Baly), Col: Chrysomelidae; frijol, repollo.
560. *Xyleborus affinis* Eich., Col: Scolytidae; Utila; adulto en febrero; tronco de palma de coco.
561. *Zabrotes subfasciatus* (Bohn.), Col: Bruchidae; Catacamas, Tegucigalpa, Comayagua, Lejamaní; adulto en abril, marzo, septiembre; adulto, larva y pupa en marzo; los huevos encima del grano (en contraste a *Acanthoscelides*); grano de frijol, (granos almacenados); plaga seria; gorgojo mexicana del frijol.
562. *Zelus longipes* (Linn.), Hemip: Reduviidae; El Zamorano, El Rosario, Comayagua, Olancho, La Esperanza; adulto en marzo, mayo, junio, julio, agosto; maíz (madurez), sandía (madurez); depredador.

563. *Zelus* sp., Hemip: Reduviidae; El Zamorano, Comayagua; adulto en febrero, marzo, julio, agosto; ninfa en octubre; maíz (madurez), cítricos, chile; depredador de *Diabrotica balteata*.
564. *Zicca* sp. (cerca de *taeniola* Dallas), Hemip: Coreidae; La Ceiba, Choloma, El Zamorano, Comayagua, Catacamas, Olancho; adulto en marzo, abril, mayo, julio, agosto, diciembre; maíz (floración, madurez), chile dulce, soya; común.